

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

本草綱目卷十二上
下

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣徐彩

欽定四庫全書

本草綱目卷十二目錄

草部

李時珍曰天造地化而草木生焉剛交于柔而成根莖柔交于剛而成枝幹葉萼屬陽華實屬陰由是草中有木木中有草得氣之粹者為良得氣之戾者為毒故有五形焉

金木水火土

五氣焉

香臭臊腥腫

五色焉

青赤黃白黑

五味焉

酸苦甘辛鹹

五性焉

寒熱溫涼

平五用焉

升降浮沉中

炎農膏而辨之軒岐述而著之漢魏唐宋

明賢良醫代有增益但三品雖存淄澠交混諸條重出涇渭
不不苟不察其精微審其善惡何以權七方衡十劑而寄死
生耶于是翦繁去複繩繆補遺析族區類振綱分目除穀菜
外凡得草屬之可供醫藥者六百一十種分為十類曰山曰

芳曰隰曰毒曰蔓曰水曰石曰苔曰雜曰有名未用

舊本草部上中

下三品共四百四十七種今併入三十一種移二十三
種入菜部三種入穀部四種入果部二種入木部自木
部移併一十四種蔓草二十九種菜部移併一十三
種果部移併四種外類有名未用共二百四十七種

神農本草經一百六十四種

梁陶弘景註

名醫別錄一百三十種

陶弘景註七十種有名未用

李氏藥錄一種

魏李當之

吳氏本草一種

魏吳普

唐本草三十四種

唐蘇恭

藥性本草一種

唐甄權

本草拾遺六十八種

唐陳藏器

食療本草二種

唐孟詵

海藥本草四種

唐李珣

四聲本草一種

唐蕭炳

開寶本草三十七種

宋馬志

嘉祐本草一十七種

宋掌馬錫

圖經本草五十四種

宋蘇頌

日華本草七種

宋人大明

用藥法象一種

元李杲

本草補遺一種

元朱震亨

本草會編一種 明汪機

本草綱目八十六種 明李時珍

附註 宋雷斅炮炙論
唐楊損之刪繁

北齊徐之才藥對
唐孫思邈千金

蜀韓保昇重註
宋寇宗奭衍義

南唐陳士良食性
唐慎微證類

陳承別說
元王好古湯液

金張元素珍珠囊
吳瑞日用

明汪穎食物
陳嘉謨蒙筌

王綸集要
憲王救荒

甯原食鑑

草之一 山草類上三十一種

甘草 本經

黃耆 本經

人參 本經

沙參 本經

薺芫 別錄

桔梗 本經

長松 拾遺

黃精 別錄

姜蕤 本經

鹿藥

委蛇附

知母 本經

肉蓯蓉 本經

列當 開寶

瑣陽 補遺

赤箭天麻 本經

朮 本經

狗脊 本經

貫衆 本經

巴戟天
本經
巴棘附

遠志
本經

百脉根
唐本

淫羊藿
本經

仙茅
開寶

玄參
本經

地榆
本經

丹參
本經

紫參 本經

王孫 本經

紫草 本經

白頭翁 本經

白及 本經

三七 綱目

右附方舊八十六新二百六十

本草綱目卷十二目錄

欽定四庫全書

本草綱目卷十二上

明 李時珍 撰

草之一 山草類上
一十三種

甘草

本經上品

釋名密甘

別錄

密草

別錄

美草

別錄

落草

別錄

靈通

珠

國老

別錄弘景曰此草最為衆藥之主經方少有不用者猶如香中有沈香也國老即帝師之稱雖非君而為

君所宗是以能安和草石而解諸毒也甄權曰諸藥中甘草為君治七十二種乳石毒解一千二百般草

木毒調和衆藥有功故有國老之號

集解

別錄曰甘草生河西川谷積沙山及上郡二月八月除日采根暴乾十日成陶弘景曰河西上

郡今不復通市今出蜀漢中悉從汶山諸道中來赤皮斷理看之堅實者是枹罕草最佳枹罕乃西羌地名亦有火炙乾者理多虛疎又有如鯉魚腸者被刀破不復好青州間有而不如又有紫甘草細而實之時亦可用蘇頌曰今陝西河東州郡皆有之春生青苗高一二尺葉如槐葉七月開紫花似柰冬結實作角子如旱豆根長者三四尺粗細不定皮赤色上有橫梁梁下皆細根也采得去蘆頭及赤皮陰乾用今甘草有數種以堅實斷理者為佳其輕虛縱理及細勒者不堪惟貨湯家用之謹按爾雅云藎大苦郭璞註似地黃又詩唐風云采苓采苓首陽之巔是也藎與苓通用首陽之山在河東蒲坂縣乃今甘草所生

處相近而先儒所說苗葉與今全別豈種類有不同者乎李時珍曰按沈括筆談云本草註引爾雅藿大苦之註為甘草者非矣郭璞之註乃黃藥也其味極苦故謂之大苦非甘草也甘草枝葉悉如槐高五六尺但葉端微尖而糙濇似有白毛結角如相思角作一本生至熱時角折子扁如小豆極堅齒齧不破今出河東西界寇氏衍義亦取此說而不言大苦非甘草也以理度之郭說形狀殊不相類沈說近之今人惟以大經寸而結緊斷文者為佳謂之粉草其輕虛細小者皆不及之錙積霏雪錄言安南甘草大者如柱土人以架屋不識果然否也

根修治

雷斅曰凡使須去頭尾尖處其頭尾吐人每用切長三寸擘作六七片入菟器中盛用酒

浸蒸從已至午取出暴乾剉細用一法每斤用酥七兩塗炙酥盡為度又法先炮令內外赤黃用時珍曰

方書灸甘草皆用長流水煎濕炙之至熟刮去赤皮
或用漿水炙熟未有酥炙酒蒸者大底補中宜灸用

瀉火宜
生用

氣味甘平無毒

寇宗奭曰生則微涼味不佳灸則溫
王好古曰氣薄味厚升而浮陽也入

足太陰厥陰經時珍曰通入手足十二經徐之才
曰木苦參乾漆為之使惡志遠反大戟芫花甘遂海

藻權曰忌豬肉時珍曰甘草與藻戟遂芫四物皆反
而胡洽居士治痰癖以十棗湯加甘草大黃乃是痰

在膈上欲令通泄以拔去病根也東垣李杲治頂下
結核消腫潰堅湯加海藻丹溪朱震亨治勞瘵蓮心

飲用芫花二方俱有甘草皆本胡居士之意也故陶
弘景言古方亦有相惡相反並乃不為害非妙達精

微者不能
知此理
主治五臟六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉

倍氣力金瘡腫解毒久服輕身延年

本經時勇切腫也温

中下氣煩滿短氣傷臟欬止渴通經脉利血氣解

百藥毒為九土之精安和七十二種石一千二百種

草

別錄

主腹中冷痛治驚癇除腹脹滿補益五臟腎氣

內傷令人陰不痿主婦人血澀腰痛凡虛而多熱者

加用之

甄權

安魂定魄補五勞七傷一切虛損驚悸煩

悶健忘通九竅利百脉益精養氣壯筋骨

大生用瀉

火熱熟用散表寒去咽痛除邪熱緩正氣養陰血補

脾胃潤肺

李杲

吐肺痿之膿血消五發之瘡疽

好解小

兒胎毒驚癇降火止痛

時珍

稍主治生用治胸中積熱去莖中痛加酒煮玄胡索

苦棟子尤妙

元素

頭主治生用能行足厥陰陽明二經汚濁之血消腫

導毒

震亨

主癰腫宜入吐藥

時珍

發明

震亨曰甘草味甘大緩諸火黃中通理厚德載物之君子也欲達下焦須用稍子杲曰甘草氣

薄味厚可升可降陰中陽也陽不足者補之以甘草溫能除大熱故生用則氣平補脾胃不足而大瀉心

火炙之則氣溫補三焦元氣而散表寒除邪熱去咽
痛緩正氣養陰血凡心火乘脾腹中急痛腹皮急縮
者宜倍用之其性能緩急而又協和諸藥使之不爭
故熱藥得之緩其熱寒藥得之緩其寒寒熱相雜者
用之得其平好古曰五味之用苦泄辛散酸收鹹斂
甘上行而發而本草言甘草下氣何也蓋甘味主中
有升降浮沉可上可下可外可內和有緩有補有
泄居中之道盡矣張仲景附子理中湯用甘草恐其
僭上也調胃承氣湯用甘草恐其速下也皆緩之
意小柴胡湯有柴胡黃芩之寒人參半夏之溫而用
甘草者則有調和之意建中湯用甘草以補中而緩
脾急也鳳髓丹用甘草以緩腎急而生元氣也乃甘
補之意又曰甘者令人中滿中滿者勿食甘甘緩而
壅氣非中滿所宜也凡不滿而用炙甘草為之補若
中滿而用生甘草為之瀉能引諸藥直至滿所甘味
入脾歸其所喜此升降浮沉之理也經云以甘補之

以甘瀉之以甘緩之是矣時珍曰甘草外赤中黃色兼坤離味濃氣薄資全土德協和羣品有元老之功善治百邪得王道之化贊帝力而人不知斂神功而已不與可謂藥中之良相也然中滿嘔吐酒客之病不喜其甘而大戟芫花甘遂海藻與之相反是亦迂緩不可以救昏昧而君子嘗見嫉於宵人之意與

頌曰按孫思邈千金方論云甘草解百藥毒如湯沃雪有中烏頭巴豆毒甘草入腹即定驗如反掌方稱大豆汁解百藥毒予每試之不效加入甘草為甘豆湯其驗乃奇也又葛洪肘後備急方云席辯刺吏嘗言嶺南俚人解蠱毒藥並是常用之物畏人得其法乃言三百頭牛藥或言三百兩銀藥久與親狎乃得其詳凡飲食時先取炙熟甘草一寸嚼之嚥汁若中毒隨即吐出仍以炙甘草三兩生薑四兩水六升煮二升日三服或用都淋藤黃藤二物酒煎溫常服則毒隨大小溲出又常帶甘草數寸隨身備急若經含

甘草而食物不吐者非毒物也三百頭牛藥即土常山也三百兩銀藥即馬兜鈴藤也詳見各條

附方

新舊十五

傷寒心悸

脈結代者甘草二兩水三升煮一半服七合日一服傷寒

類傷寒咽痛

少陰證甘草湯主之用甘草二兩蜜水炙水二升煮一升半服五合日二服

張仲景傷寒論

肺熱喉痛

有痰熱者甘草炒二兩桔梗米泔浸一夜一兩每服五錢水一鍾半

入阿膠半片煎服

錢乙直訣肺痿多涎

而肺痿吐涎沫頭眩小便數而不欬者肺中冷也甘草

乾薑湯溫之甘草炙四兩升煮一升五合分服

乾薑炮二兩水三升張仲景金匱要畧

肺痿久

嗽

涕唾多骨節煩悶寒熱以甘草三兩炙搗為末每日取小便三合調甘草末一錢服之廣利方

小兒熱嗽

甘草二兩豬膽汁浸五宿炙研末蜜丸綠豆大食後薄荷湯下十九名涼膈丸聖

惠方初生解毒

小兒初生未可便與硃砂蜜只以甘草一指節長炙碎以水二合煮取一合以

綿染點兒口中可為一規殼當吐出胸中惡汁此後待兒饑渴更與之令兒智慧無病出痘稀少王璆

選方初生便閉

甘草枳殼煨各一錢水半盞煎服全幼心鑑小兒撮口發紫用生

甘草二錢半水半盞煎六分溫服令吐痰涎後以乳汁點兒口中金匱玉函嬰兒目澀內

目閉不開或腫羞明或出血者名慢肝風用甘草一截以豬膽汁炙為末每用米泔調少許灌之幼幼

新書小兒遺尿

大甘草頭煎湯夜夜服之危氏得效方小兒尿血甘草一兩二錢水六

合煎二合一歲兒一日服盡姚和衆至寶方小兒羸瘦甘草三兩炙焦為末蜜丸綠豆大每溫水

下五丸日二服金匱玉函大人羸瘦甘草三兩炙每旦以小便秘要

赤白痢下

在宣州衍所傳方用甘草一尺炙劈破以淡漿水煎水一升半煎取八合服之立效梅師方

用甘草一兩炙肉豆蔻七個
煨剉以水三升煎一升分服
舌腫塞口 不治殺人甘草煎濃湯熱漱頻

吐 濟總錄 聖 太陰口瘡 甘草二寸白礬一粟大
同嚼燕汁 保命集 發背癰疽 元

亮海上集驗方云李北海言此方乃神授極奇秘用甘草三大兩生搗篩末大麥麩九兩和勻取好酥少許入

內下沸水搜如餅狀方圓大於瘡一分熱傳腫上以紬片及故紙隔令通風冷則換之已成者膿水自出未成

者腫便內消仍當喫黃芪粥為妙 又一法甘草一大兩水炙搗碎水一大升浸之器上橫一小刀子露一宿

平明以物攪令沫出去沫服之但 諸般癰疽 甘草三兩是瘡腫發背皆甚效 蘇頌圖經 微炙切以

酒一斗同浸瓶中用黑鉛一片溶成汁投酒中取一如此九度令病者飲酒至醉寢後即愈也 經驗方一

切癰疽

諸發預期服之能消腫逐毒使毒不內攻功效不可具述用大橫文粉草二斤槌碎河水浸一

宿揉取濃汁再以密絹過銀石器內慢火熬成膏以甌罐收之每服一二匙無灰酒或白湯下曾服丹藥者亦

解之或微利無妨名癰疽秘塞生甘草二錢半井水煎服能疎導下惡物直

指乳癰初起灸甘草二錢新水煎服些小癰癩發熱時仍令人嘔之直指方即用粉

草節晒乾為末熟酒服一二錢連痘瘡煩渴粉甘草進數服病熱皆止外科精要方

根等分水煎服之甘草能通陰下懸癰生於穀道前血脈發瘡痘也直指方後初發如松

子大漸如蓮子數十日後赤腫如桃李成膿即破破則難愈也用橫文甘草一兩四寸截斷以深澗長流

水一盃河水井水不用以文武火慢慢煎水炙之自早至午令水盡為度劈開視之中心水潤乃止細剉

用無灰好酒二小盞煎至一盞溫服次日再服便可
保無虞此藥不能急消過二十日方得消盡與化守

康朝病已破衆醫拱手服此二劑即合陰頭生瘡
口乃韶州劉從周方也李迅癰疽方陰頭生瘡

甘草末頻頻塗之陰下濕瘡甘草煎湯日洗三
神效千金方五度古今錄驗代指

腫痛之甘草煎湯漬凍瘡發裂甘草煎湯洗之次以黃
連黃藥黃芩末入輕粉

麻油調傳湯火瘡灼甘草煎蜜塗
談莖翁方李樓奇方蠱毒藥毒節以

真麻油浸之年久愈妙每用嚼小兒中蠱欲死者甘
噉或水煎服神效直指方草半兩水

一盞煎五分服當牛馬肉毒甘草煮濃汁飲一二升
吐出金匱玉函或煎酒服取吐或下如

渴不可飲水飲之飲饌中毒未審何物卒急無藥只
即死千金方煎甘草薺芩湯入口便

活金匱

水菘岩毒

菜中有水菘岩葉圓而光有毒
誤食令人狂亂狀若中風或作

吐以甘草煮汁服之即
解金匱玉函妙方

黃耆

本經上品

釋名黃芪

綱目

戴糝

本經

戴榘

別錄

又榘

草別錄

又榘

別錄王孫

藥性論

時珍曰耆長也

黃耆色黃為補藥

之長故名今俗通作黃芪或作耆者非矣耆

乃耆龜之耆音尸王

孫與牡蒙同名異物

集解別錄曰黃耆生蜀郡山谷白水漢中二月十月

采陰乾弘景曰第一出隴西洮陽色黃白甜美

今亦難得次用黑水宕昌者色白肌理粗新者亦甘

而溫補又有蠶陵白水者色理勝蜀中者而冷補又

有赤色者可作膏貼俗方多用道家不須恭曰今出
原州及華原者最良蜀漢不復采用宜州寧州者亦
佳頌曰今河東陝西州郡多有之根長一二尺以來
獨莖或作叢生枝幹去地二三寸其葉扶疎作羊齒
狀又如蒺藜苗七月中開黃紫花其實作莢子長寸
許八月中采根用其皮折之如綿謂之綿黃者然有
數種有白水耆赤水耆木耆功用並同而力不及白
水者木耆短而理橫今人多以苜蓿根假作黃耆折
皮亦似綿頗能亂真但苜蓿根堅而脆黃耆至柔韌
皮微黃褐色肉中白色此為異耳承曰黃耆本出綿
上者為良故名綿黃耆非謂其柔韌如綿也今圖經
所繪憲州者地與綿上相隣也好古曰綿上即山西
沁州白水在陝西同州黃耆味甘柔軟如綿能令人
肥首苜蓿根味苦而堅脆俗呼為土黃耆能令人瘦用
者宜審嘉謨曰綿上沁州鄉名今有巡檢司白水赤
水二鄉俱屬隴西時珍曰黃耆葉似槐葉而微尖小

又似蒺藜葉而微濶大青白色開黃紫花大如槐花
結小尖角長寸許根長二三尺以紫實如箭藜者為
良嫩苗亦可煉淘茹食其子收
之十月下種如種菜法亦可

修治

數曰凡使勿用木耆草真相似只是生時葉短
并根橫也須去頭上皺皮蒸半日擘細於槐砧

上剉用時珍曰今人但槌扁以蜜水塗炙數次以熟
為度亦有以鹽湯潤透器盛於湯瓶蒸熟切用者

根氣味甘微溫無毒

本經

白水者冷補

別錄元素曰味甘氣溫平氣薄

味厚可升可降陰中陽也入手足太陰氣分又入手
少陽足少陰命門之才曰茯苓為之使惡龜甲白鮮

皮
主治癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻

補虛小兒百病

本經

婦人子臟風邪氣逐五臟間惡血

補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利陰氣

別錄

主虛喘腎衰耳聾耳瘖寒熱治發背內補甄權助氣壯

筋骨長肉補血破癥癖瘰癧瘻贅腸風血崩帶下赤

白痢產前後一切病月候不勻痰嗽頭風熱毒赤目

日華治虛勞自汗補肺氣瀉肺火心火實皮毛益胃氣

去肌熱及諸經之痛元素主太陰瘧疾陽維為病苦寒

熱督脉為病逆氣裏急好古

發明

弘景曰出隴西者溫補出白水者冷補又有赤色者可作膏用消癰腫藏器曰虛而客熱用白

水黃者虛而容冷用隴西黃者大明曰黃者藥中補益呼為羊肉白水者涼無毒排膿治血及煩悶熱毒骨蒸勞赤水者涼無毒治血退熱毒餘功並同木者涼無毒治煩排膿之力微於黃者遇闕即倍用之元素曰黃者甘溫純陽其用有五補諸虛不足一也益元氣二也壯脾胃三也去肌熱四也排膿止痛活血生血內托陰疽為瘡家聖藥五也又曰補五臟諸虛治脉弦自汗瀉陰火去虛熱無汗則發之有汗則止之好古曰黃者治氣虛盜汗并自汗及膚痛是皮表之藥治路血柔脾胃是中州之藥治傷寒尺脉不至補腎臟元氣是裏藥乃上中下內外三焦之藥也杲曰靈樞云衛氣者所以溫分肉而充皮膚肥腠理而司開闔黃者既補三焦實胃氣與桂同功特比桂甘平不辛熱為異耳但桂則通血脉能破血而熱衛氣者則益氣也又黃者與人參甘草三味為除躁熱肌熱之聖藥脾胃一虛肺氣先絕必用黃者溫分肉益

皮毛實腠理不令汗出以益元氣而補三焦震亨曰黃耆補元氣肥白而多汗者為宜若面黑形實而瘦者服之令人胸滿宜以三拗湯瀉之宗奭曰防風黃耆世多相須而用唐許胤宗初仕陳為新蔡王外兵參軍時柳太后病風不能言脉沈而口噤胤宗曰既不能下藥宜湯氣蒸之藥入腠理周時可瘥乃造黃耆防風湯數斛置於牀下氣如烟霧其夕便得語也杲曰防風能制黃耆黃耆得防風其功愈大乃相畏而相使也震亨曰人之口通乎地鼻通乎天口以養陰鼻以養陽天主清故鼻不受有形而受無形地主濁故口受有形而兼乎無形柳太后之病不言若以有形之湯緩不及事今授以二物湯氣滿室則口鼻俱受非智者通神不可回生也杲曰小兒外物驚宜用黃連安神丸鎮心藥若脾胃寒濕吐腹痛瀉痢青白宜用益黃散藥如脾胃伏火勞役不足之證及服巴豆之類胃虛而成慢驚者用益黃理中之藥

必傷人命當於心經中以甘溫補土之源更於脾土中以甘寒瀉火以酸涼補金使金旺火衰風木自平矣今立黃耆湯瀉火補金蓋土為神治之法用炙黃耆二錢人參一錢炙甘草五分白芍藥五分水一大盞煎半盞溫服機曰蕭山魏直著博愛心鑑三卷言小兒痘瘡惟有順逆險三證順者為吉不用藥逆者為凶不必用藥惟險乃悔吞之象當以藥轉危為安宜用保元湯加減主之此方原出東垣治慢驚土衰火旺之法今借而治痘以其內固營血外護衛氣滋助陰陽作為膿水其證雖異其理則同去白芍藥加生薑改名曰保元湯炙黃耆三錢人參二錢炙甘草一錢生薑一片水煎服之險證者初出圓暈乾紅少潤也將長光澤頂陷不起也既出雖起慘色不明也漿行色灰不榮也漿定光潤不消也漿老濕潤不斂也結痂而胃弱內虛也痂落而口渴不食也痂後生癰腫也癰腫潰而斂遲也凡有諸證並宜此湯或

加芎藭加官桂加糯米以助之詳見本書嘉謨曰人參補中黃耆實表凡內傷脾胃發熱惡寒吐泄急卧脹滿痞塞神短脉微者當以人參為君黃耆為臣若表虛自汗亡陽潰瘍痘疹陰瘡者當以黃耆為君人參為臣不可執一也

附方

新舊五九

小便不通

綿黃耆二錢水二盞煎一盞服小兒減半

總微論

酒

疸黃疾

心下懊痛足脛滿小便黃飲酒發赤黑黃斑由大醉當風入水所致黃耆二兩木蘭一兩

為末酒服方寸匕日三服

時後方氣虛白濁

黃芪鹽炒半兩茯苓一兩為末每服一錢白湯

下經

治渴補虛

男子婦人諸虛不足煩悸焦渴面色萎黃不能飲食或先渴而後發

瘡癰或先癰疽而後發渴並宜常服此藥平補氣血安和臟腑終身可免癰疽之疾用綿黃耆箭籛者去

蘆六兩一半生焙一半以鹽水潤濕飯上蒸三次培
劉粉甘草一兩一半生用一半炙黃為末每服二錢

白湯點服早晨日午各一服亦可
煎服名黃芪六一湯 外科精要 老人悶塞 綿黃者
陳皮去

白各半兩為末每服三錢用大麻子一合研爛以水
濾漿煎至乳起入白蜜一匙再煎沸調藥空心服甚

者不過二服此藥不冷不熱常服
無秘塞之患其效如神和劑局方 腸風瀉血 黃耆黃
連等分

為末麩糊丸綠豆大每服三十
丸米飲下 孫用和秘寶方 尿血沙淋 痛不可忍
黃耆人參

等分為末以大蘿蔔一個切一指厚大四五片蜜二
兩淹炙令盡不令焦點末食無時以鹽湯下 永類

方吐血不止 黃耆二錢半紫背浮萍五錢為末
每服一錢薑蜜水下 聖濟總錄 欬嗽

膿血咽乾乃虛中有熱不可服涼藥以好黃耆四兩
甘草一兩為末每服二錢點湯服 席庭賞方

肺癰得吐

黃耆二兩為末每服二錢水一中盞煎至六分溫服日三四服 聖惠方

甲疽

瘡膿

生足趾甲邊赤肉突出時常舉發者黃耆二兩
蔞茹一兩醋浸一宿以豬脂五合微火上煎取

二合絞去滓以封瘡口上日胎動不安 腹痛下黃汁
三度其內自消 外臺秘要

各一兩糯米一合水一升 陰汗濕痒 綿黃耆酒炒為
煎半升分服 婦人良方 末以熟豬心點

喫妙 趙真 痒疽內固 黃耆人參各一兩為末入真
人濟急方 龍腦一錢用生藕汁和丸綠

豆大每服二十九溫水
下日日服 本事方

莖葉主治療渴及筋攣癰腫疽瘡 別錄

人參

本經上品

釋名人漫

音參或省作漫

黃參

吳普

血參

別錄

人銜

本經

鬼蓋

本經

草別

錄別

地精

廣雅

海腴

皴面

還丹

廣雅

時珍

浸漸長成者根如人形有神故謂之人漫神草漫字從漫亦浸漸之義漫即浸字後世因字文繁遂以參星之字代之從簡便爾然承誤日久亦不能變矣惟張仲景傷寒論尚作漫字別錄一名人微微乃漫字之訛也其成有階級故曰人銜其草背陽向陰故曰鬼蓋其在五參色黃屬土而補脾胃生陰血故有黃參血參之名得地之精靈故有土精地精之名廣五行記云隋文帝時上黨有人宅後每夜聞人呼聲求之不得去宅一里許見人參枝葉異常掘之入地五尺得人漫一如人體四肢畢備呼聲遂絕觀此則土精之名尤可證也禮斗威儀云下有人參上有紫氣春秋運斗樞云搖光星散而為人參人君廢山瀆之

利則搖光不明人參不生觀
此則神草之名又可證矣

集解

別錄曰人參生上黨山谷及遼東二月四月八
月上旬采根竹刀刮暴乾無令見風根如人形

者有神善曰或生邯鄲三月生葉小銳枝黑莖有毛
三月九月采根根有手足面目如人者神弘景曰上
黨在冀州西南今來者形長而黃狀如防風多潤寶
而甘俗乃重百濟者形細而堅白氣味薄於上黨者
次用高麗者高麗即是遼東形大而虛軟不及百濟
並不及上黨者其草一莖直上四五相對生花紫色
高麗人作人參讚云三極五葉背陽向陰欲來求我
椒樹相尋椒音賈樹似桐甚大陰廣則多生采作甚
有法今近山亦有但作之不好恭曰人參見用多是
高麗百濟者潞州太行紫團山所出者謂之紫團參
保升曰今沁州遼州澤州箕州平州易州檀州幽州
媯州并州並出人參蓋其山皆與太行連亘相接故

也珣曰新羅國所貢者有手足狀如人形長尺餘以杉木夾定紅絲纏飭之又沙州參短小不堪用頌曰今河東諸州及泰山皆有之又有河北權塲及閩中來者名新羅人參俱不及上黨者佳春生苗多於深山背陰近椒漆下濕潤處初生小者三四寸許一極五葉四五年後生兩極五葉未有花莖至十年後生三極年深者生四極各五葉中心生一莖俗名百尺杵三月四月有花細小如粟蕊如絲紫色秋後結子或七八枚如大豆生青熟紅自落根如人形者神泰山出者葉韋青根白珠別江淮間出一種土人參苗長一二尺葉如匙而小與桔梗相似相對生生五七節根亦如桔梗而柔味極甘美秋生紫花又帶青色春秋采根土人或用之相傳欲試上黨參但使人同走一舍人參一空口度走三五里許其不舍人參走必大喘舍者氣息自如其人參乃真也宗奭曰上黨者根頗纖長根下垂有及一尺餘者或十岐者

其價與銀等稍為難得土人得一窠則置板上以新
絨飾之嘉謨曰紫團參紫色稍扁百濟參白堅且
圓名白條參俗名羊角參遼東參黃潤纖長有鬚俗
名黃參獨勝高麗參近紫體虛新羅參亞黃味薄肖
人形者神其類雞腿者力洪時珍曰上黨今潞州也
民以人參為地方害不復采取今所用者皆是遼參
其高麗百濟新羅三國今皆屬於朝鮮矣其參猶來
中國互市亦可收子於十月下種如種菜法秋冬采
者堅實春夏采者虛軟非地產有虛實也遼參連皮
者黃潤色如防風去皮者堅白如粉偽者皆以沙參
薺芫桔梗采根造作亂之沙參體虛無心而味淡薺
芫體虛無心桔梗體堅有心而味苦人參體實有心
而味甘微帶苦自有余味俗名金井玉闌也其似人
形者謂之孩兒參尤多贗偽宋蘇頌圖經本草所繪
潞州者三桎五葉真人參也其滁州者乃沙參之苗
葉沁州兗州者皆薺芫之苗葉其所云江淮土人參

者亦薺芘也並失之詳審今潞州者尚不可得則他處者尤不可信矣近又有薄夫以人參先浸取汁自啜乃晒乾復售謂之湯參全不任用不可不察考月池翁諱言聞字子郁銜太醫吏目嘗著人參傳上下卷甚詳不能備錄亦畧

節要語於下條云耳

修治

弘景曰人參易蛀虫惟納新器中密封可經年不壞炳曰人參頻見風日則易蛀惟用盛過麻

油瓦罐泡淨焙乾入華陰細辛與參相間收之密封可留經年一法用淋過竈灰晒乾罐收亦可李言聞曰人參生時背陽故不喜見風曰凡生用宜吹咀熟用宜隔紙焙之或醇酒潤透吹咀焙熟用並忌鐵器

根氣味甘微寒無毒

別錄曰微溫普曰神農小寒桐君雷公苦黃帝岐伯甘無毒元

素曰性溫味甘微苦氣味俱薄浮而升陽中之陽也又曰陽中微陰之才曰茯苓馬藟為之使惡溲疏

鹵鹹反藜蘆一云畏五靈脂惡皂莢黑豆動紫石英
元素曰人參得升麻引用補上焦之元氣瀉肺中之
火得茯苓引用補下焦之元氣瀉腎中之火得麥門
冬則生脉得乾薑則補氣果曰得黃耆甘草乃甘溫
除大熱瀉陰火補元氣又為瘡家聖藥震亨曰人參
入手大陰與藜蘆相反服參一兩入藜蘆一錢其功
盡廢也言聞曰東垣李氏理脾胃瀉陰火交泰丸內
用人參皂莢是惡而不惡也古方療月閉四物湯加
人參五靈脂是畏而不畏也又療痰在胸膈以人參
藜蘆同用而取涌越是激其怒性也此皆精微妙奧
非達權衡者不能知

主治補五臟安精神定魂魄止驚悸除邪

氣明目開心益智久服輕身延年本經療腸胃中冷心

腹鼓痛胸脇逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脉破

堅積令人不忘別錄主五勞七傷虛損痰弱止嘔噦補

五臟六腑保中守神消胸中痰治肺痿及癰疾冷氣

逆上傷寒不下食凡虛而多夢紛紛者加之甄權止煩

躁變酸水李珣消食開胃調中治氣殺金石藥毒大明治

肺胃陽氣不足肺氣虛促短氣少氣補中緩中瀉心

肺脾胃中火邪止渴生津液元素治男婦一切虛證發

熱自汗眩暈頭痛反胃吐食痰瘧滑瀉久痢小便頻

數淋瀝勞倦內傷中風中暑痿痺吐血嗽血下血

淋血崩胎前產後諸病

時珍

發明

弘景曰人參為藥切要與甘草同功杲曰人參甘溫能補肺中元氣肺氣旺則四臟之氣皆旺

精自生而形自盛肺主諸氣故也張仲景云病人汗後身熱亡血脉沉遲者下荊身涼脉微血虛者並加人參古人血脫者益氣蓋血不自生須得生陽氣之藥乃生陽生則陰長血乃旺也若單用補血藥血無由而生矣素問言無陽則陰無以生無陰則陽無以化故補氣須用人參血虛者亦須用之本草十劑云補可去弱人參羊肉之屬是也蓋人參補氣羊肉補形形氣者有無之象也好古曰潔古老人云以沙參代人參取其味甘也然人參補五臟之陽沙參補五臟之陰安得無異雖云補五臟亦須各用本臟藥相佐使引之言聞曰人參生用氣涼熟用氣溫味甘補陽微苦補陰氣主生物本乎天味主成物本乎地氣

味生成陰陽之造化也涼者高秋清肅之氣天之陰也其性降溫者陽春生發之氣天之陽也其性升甘者濕土化成之味地之陽也其性浮微苦者火土相生之味地之陰也其性沉人參氣味俱薄氣之薄者生降熟升味之薄者生升熟降如土虛火旺之病則宜生參涼薄之氣以瀉火而補土是純用其氣也脾虛肺怯之病則宜熟參甘溫之味以補土而生金是純用其味也東垣以相火乘脾身熱而煩氣高而喘頭痛而渴脈洪而大者用黃蘗佐人參孫真人治夏月熱傷元氣人汗大泄欲成痿厥用生脈散以瀉熱火而救金水君以人參之甘涼瀉火而補元氣臣以麥門冬之苦甘寒清金而滋水源佐以五味子之酸溫生腎精而收耗氣此皆補天元之真氣非補熱火也白飛霞云人參鍊膏服回元氣於無何有之鄉凡病後氣虛及肺氣嗽者並宜之若氣虛有火者合天門冬膏對服之

正誤

數曰夏月少使人參發心症之病好古曰人參甘溫補肺之陽泄肺之陰肺受寒邪宜此補之

肺受火邪則反傷肺宜以沙參代之王綸曰凡酒色過度損傷肺腎真陰陰虛火動勞嗽吐血欬血等證勿用之蓋人參入手太陰能補火故肺受火邪者忌之若誤用參者甘溫之劑則病日增服之過多則死不可治蓋甘溫助氣氣屬陽陽旺則陰愈消惟宜苦甘寒之藥生血降火世人不識往往服參者為補而死

死者多矣 言聞曰孫真人云夏月服生脉散清暑益氣湯三劑則百病不生李東垣亦言生脉散清暑益氣湯乃三伏瀉火益金之聖藥而雷斅反謂發心症久患非矣症乃臍旁積氣非心病也人參能養正破堅積豈有發症之理觀張仲景治腹中寒氣上衝有頭足上下痛不可觸近嘔不能食者用大建中湯可知矣又海藏王好古言人參補陽泄陰肺寒宜用肺熱不宜用節齋王綸因之和之謂參者能補肺火陰虛

火動失血諸病多服必死二家之失皆偏矣夫人參能補元陽生陰血而瀉陰火東垣李氏之說也明矣仲景張氏言亡血血虛者並加人參又言肺寒者去人參加乾薑無令氣壅丹溪朱氏亦言虛火可補參耆之屬實火可瀉苓連之屬二家不察三氏之精微而謂人參補火謬哉夫火與元氣不兩立元氣勝則邪火退人參既補元氣而又補邪火是反復之小人矣何以與甘草苓朮謂之四君子耶雖然三家之言不可盡廢也惟其語有滯故守之者泥而執一遂視人參如蛇蝎則不可也凡人面白面黃面青薰悴者皆脾肺腎氣不足可用也面赤面黑者氣壯神強不可用也脉之浮而芤濡虛大遲緩無力沉而遲濇弱細結代無力者皆虛而不足可用也若弦長緊實滑數有力者皆火鬱內實不可用也潔古謂喘嗽勿用者痰實氣壅之喘也若腎虛氣短喘促者必用也仲景謂肺寒而欬勿用者寒束熱邪壅鬱在肺之欬也

若自汗惡寒而欬者必用也東垣謂久病鬱熱在肺
勿用者乃火鬱于內宜發不宜補也若肺虛火旺氣
短自汗者必內也丹溪言諸痛不可驟用者乃邪氣
方銳宜散不宜補也若裏虛吐利及久病胃弱虛痛
喜按者必用也節齋謂陰虛火旺勿用者乃血虛火
亢能食脉弦而數涼之則傷胃溫之則傷肺不受補
者也若自汗氣短肢寒脉虛者必用也如此詳審則
人參之可用不可用思過半矣機曰節齋王綸之說
本於海藏王好古但綸又過于矯激丹溪言虛火可
補須用參芪又云陰虛潮熱喘嗽吐血盜汗等證四
物加人參黃蘗知母又云好色之人肺腎受傷欬嗽
不愈瓊玉膏主之又云肺腎虛極者獨參膏主之是
知陰虛勞瘵之證未嘗不用人參也節齋私淑丹溪
者也而乃相及如此斯言一出印定後人眼目凡遇
前證不問病之宜用不宜輒舉以藉口致使良工掣
肘惟求免夫病家之怨病家亦以此說橫之胸中甘

受若寒雖至上嘔下泄去死不遠亦不悟也古今治勞莫過於葛可久其獨參湯保真湯何嘗廢人參而不用耶節齋之說誠未之深思也楊起曰人參功載本草人所共知近因病者吝財薄醫醫服筭本惜費不肯用參療以致輕者致重重者至危然有肺寒肺熱中滿血虛四證只宜散寒消熱消脹補營不用人參其說近是殊不知各加人參在內護持元氣力助羣藥其功更捷若曰氣無補法則謬矣古方治肺寒以溫肺湯肺熱以清肺湯中滿以分消湯血虛以養營湯皆有人參在焉所謂邪之所勝其氣必虛又曰養正邪自除陽旺則生陰血貴在配合得宜爾庸醫每謂人參不可輕用誠哉庸也好生君子不可輕命薄醫醫亦不可計利不用書此奉勗幸勿曰迂

附方

舊九新六十八

人參膏

用人參十兩細切以活火二升蓋浸透入銀石器內桑柴火緩

緩煎取十盞濾汁再以水十盞煎取五盞與前汁合煎成膏瓶收隨病作湯使丹溪云多慾之人腎氣衰憊欬嗽不止用生薑橘皮煎湯化膏服之浦江鄭兄五月患痢入犯房室忽發昏運不知人事手撒目暗自汗如雨喉中痰鳴如拽鋸聲小便遺失脉大無倫此陰虧陽絕之證也予令急煎大料人參膏仍與灸氣海十八壯右手能動再三壯唇口微動遂與膏服一盞半夜後服三盞眼能動盡三斤方能言而索粥盡五斤而痢止至十斤而全安若作風治則誤矣一人背疽服內托十宣藥已多膿出作嘔發熱六脉沉數有力此潰瘍所忌也遂與大料人參膏入竹瀝飲之參盡一十六斤竹代百餘竿而安後經旬餘值大風拔木瘡起有膿中有紅線一道過肩脾抵右肋予曰急作參膏以芎歸橘皮作湯入竹瀝薑汁飲之盡三斤而瘡潰調理乃安若癰疽潰後氣血俱虛逆不食變證不一者以參耆歸朮等分煎膏服之最妙

治中湯

頌曰張仲景治胸脾心中痞堅留氣結胸胸滿脇下逆氣搶心治中湯主之即理中湯人

參朮乾薑甘草各三兩四味以水八升煮三升每服一升日三服隨證加減此方自晉宋以後至唐名醫

治心腹病者無不用之或作湯或蜜丸或為散皆有奇效胡洽居士治霍亂謂之溫中湯陶隱居百一方

云霍亂餘藥乃或難求而治中方四順湯厚朴湯不可暫缺常須預合自隨也唐石象公王方慶云數方

不惟霍亂可醫諸病皆療也四順湯用人參甘草乾薑附子炮各二兩水六升煎二升半分四服

君子湯

治脾胃氣虛不思飲食諸病氣虛者以此為主入參一錢白朮二錢白茯苓一錢炙甘草

五分薑三片棗一枚水二鍾煎一鍾食前溫服隨證加減和濟局方開胃化痰不思

不拘大人小兒人參焙二兩半夏薑汁浸焙五錢為末飛羅麪作糊丸綠豆大食後薑湯下三五十九日

三服聖惠方加陳橘
皮五錢 經驗方 胃寒氣滿不能傳化易饑不能

子末半錢生薑二錢水七合煎二合雞
子清一枚打轉空心服之 聖濟總錄 脾胃虛弱不

飲食生薑半斤取汁白蜜十兩人參末四兩
銀錫煎成膏每米飲調服一匙 普濟方 胃虛惡

心或嘔吐有痰人參一兩水二盞煎一盞入竹瀝一
盞薑汁三匙食遠溫服以知為度老人尤宜 簡

便方胃寒嘔惡 不能腐熟水穀食即嘔吐人參丁香藿
香各二錢半橘皮五錢生薑三片水二

盞煎一盞溫 反胃嘔吐 飲食入口即吐困弱無力垂
服 扶萃方 死者上黨人參三大兩拍破

水一大升煮取四合熱服日再兼以人參汁入粟米
雞子白薤白煮粥與噉李直方司勳於漢南患此兩

月餘諸方不瘥遂與此方當時便定後十餘日遂入
京師絳每與名醫論此藥難可為傳也李絳兵部手

集食入即吐

人參半夏湯用人參一兩半夏一兩五錢生薑十片水一斗以杓揚二百四十

遍取三升入白蜜三合煮一升半分服張仲景金匱方霍亂嘔惡人參二兩水

一盞入雞子白一枚再煎溫服一加丁香衛生家寶方霍亂煩悶人參五錢桂

蓋煎服聖惠方霍亂吐瀉煩躁不止人參二兩橘皮三兩

服濟總錄聖妊娠吐水酸心腹痛不能飲食人參乾薑炮

大每服五十九丸米湯下和劑局方陽虛氣喘自汗盜汗氣短頭暈人

作四帖每帖以生薑十片流水兩喘急欲絕上氣鳴

參末湯服方寸七日產後發喘乃血入肺竅危証也

五六服效肘後方人參末一兩蘇木二

兩水二盞煮汁一盞調
參末服神效 聖惠方 產後血運 人參一兩紫蘇半

合煎服 產後不語 人參石菖蒲石蓮肉等分每
醫方摘要 服五錢水煎服 婦人良方 產

後諸虛 發熱自汗人參當歸等分為末用豬腰子一
個去膜切小片以水三升糯米半合葱白二

莖煮米熟取汁一盞入藥煎 產後秘塞 出血多以
至八分食前溫服 永類方 產後秘塞 參麻子仁枳

殼麩炒為末煉蜜丸 梧子大每 橫生倒產 人參末乳
服五十九丸米飲下 濟生方 橫生倒產 香末各一

錢丹砂末五分研勻雞子白一枚入生薑自然汁三
匙攪勻冷服即母子俱安神效此施漢卿方也 婦

人良 開心益智 人參末一兩鍊成豬脂肪十兩以
淳酒和勻每服一盃日再服服至百

日耳目聰明骨髓充盈肌膚潤澤日 聞雷即昏 一
記千言兼去風熱痰病 千金方 聞雷即昏 兒七

歲聞雷即昏倒不知人事此氣怯也。以人參當歸麥門冬各二兩五味子五錢水一斗煎汁五升再水五升煎滓取汁二升合煎成膏每服三匙白湯化。忽下服盡一斤自後聞雷自若矣。揚起簡便方。

喘悶絕

方見大黃下

離魂異疾

有人卧則覺身外有身一

魂歸於肝此由肝虛邪襲魂不歸舍病名曰離魂。用人參龍齒赤茯苓各一錢水一盞煎半盞調飛過朱

硃末一錢睡時服一夜三服三夜後真者。怔忡自汗氣爽假者即化矣。夏子益怪證奇疾方。

心氣不足也。人參半兩當歸半兩用豬腰子二個以水二盞煮至一盞半取腰子細切人參歸同煎至

八分空心喫腰子以汁送下其滓焙乾為末以山藥末作糊丸綠豆大每服五十丸食遠棗湯下不過二

服即愈此昆山神濟大師方也。一心下結氣凡心下加乳香二錢王璆百一選方。

則無常覺膨滿多食則吐氣引前後噫呃不除由思慮過多氣不以時而行則結滯謂之結氣人參一兩

橘皮去白四兩為末煉蜜九梧子
大每米飲下五六十丸 聖惠方 房後困倦 人參七錢陳皮

一錢水一盞半煎八分食前溫服
日再服千金不傳 趙永菴方 虛勞發熱 愚魯湯用上黨

人參銀州柴胡各三錢大棗一枚生薑三兩水一鍾
半煎七分食遠溫服日再服以愈為度 奇效良方

肺熱聲啞 人參二兩訶子一兩為末
末嚙嚙 丹溪摘玄 肺虛久咳 人參末二兩鹿

角膠炙研一兩每服三錢用薄荷豉湯一盞葱少許
入鈔子煎一二沸傾入盞內過效時溫呷三五口甚

佳食 止咳化痰 人參末一兩明礬二兩以醋二
療本草 升熬礬成膏入參末煉蜜和收每

以豌豆大一丸放舌下其小兒喘欬 發熱自汗吐紅
嗽即止咳自消 簡便方 脈虛無力者人

參天花粉等分每服半錢蜜喘欬吐血
水調下以瘥為度 經濟方 急欬血吐血

脈無力者人參末每服三錢雞子清調之五更初服
便睡去枕仰卧只一服愈年深者再服咯血者服盡

一兩甚好一方以烏鷄子水磨千遍自然化作水調
藥尤妙忌醋醎腥醬麪鮓醉飽將息乃佳 沈存中

靈苑 欬嗽吐血
人參黃耆飛羅麪各一兩百合五錢 為末水丸梧子大每服五十九食前

茅根湯下 朱氏集驗方用人參乳香辰砂等分為
末烏梅肉和丸彈子大每白湯化下一丸日一服

虛勞吐血
甚者先以十灰散止之其人必因倦法當 補陽生陰獨參湯主之好人參一兩肥棗

五枚水二鍾煎一鍾服熟睡一覺即減吐血下血
五六繼服調理藥 葛可久十藥神書 七

情所感酒色內傷氣血妄行口鼻俱出心肺脈破血
如泉湧須臾不救用人參焙側柏葉蒸焙荊芥穗燒

存性各五錢為末用二錢入飛羅麪二錢以新汲水調如稀糊服少頃再啜一服立止 華陀中藏經

血不止

人參柳枝寒食采者等分為末每服一錢東流水服日三服無柳枝用蓮子心 聖

濟總錄

齒縫出血

人參赤茯苓麥門冬各二錢水一鍾煎七分食前溫服日再蘇東坡得此

自謂神奇後生小子多患此病予累試之累如所言談堃翁試效方

陰虛尿血

人參焙黃耆鹽

水炙等分為末用紅皮大蘿蔔一枚切作四片以蜜二兩將蘿蔔逐片蘸灸令乾再灸勿令焦以蜜盡為

度每用一片蘸藥食之仍以鹽湯送下以瘥為度三因方沙淋石淋上方同

消渴引

飲人參為末雞子清調服一錢日三四服 集驗用 人參栝樓根等分生研為末煉蜜丸梧子大每服

百丸食前麥門冬湯下日二服以愈為度名玉壺丸 忌酒麪炙燻 鄭氏家傳消渴方人參一兩粉草二

兩以雄豬膽汁浸炙腦子半錢為末蜜丸芡子大每
嚼一丸冷水下 聖濟總錄用人參一兩葛粉二兩

為末發時以燻豬湯一升入藥三錢蜜二兩慢火熬
至三合狀如黑餲以瓶收之每夜以一匙含嚙不過

三服取 虛瘧發熱 人參二錢二分雄黃五錢為末端
效也 午日用梭尖搗丸梧子大發日侵

辰井華水吞下七丸發前再服忌諸般熱 冷痢厥逆
物立效一方加神麩等分 丹溪纂要

六脉沉細人參大附子各一兩半每服半兩生薑十
片丁香十五粒粳米一撮水二盞煎七分空心溫服

經驗 下痢禁口 人參蓮肉各三錢以井華水二盞煎
方 一盞細細呷之或加薑汁炒黃連三

錢 經驗 老人虛痢 不止不能飲食上黨人參一兩
良選方 鹿角去皮炒研五錢為末每服

方寸七米湯調下日 傷寒壞證 凡傷寒時疫不問陰
三服 十便良方 陽老幼妊婦誤服藥

餌因重垂死脉沉伏不省人事七日以後皆可服之
百不失一此名奪命散又名復脉湯人參一兩水二

鍾繫火煎一鍾以井水浸冷服之少頃鼻梁有汗出
脉復立瘥蘇韜光侍即云用此救數十人予作清流

宰縣倅申屠行輔之子婦患時疫三十餘日傷寒厥
已成壞病令服此藥而安王璆百一選方

逆身有微熱煩燥六脉沉細微弱此陰極發躁也無
憂散用人參半兩水一鍾煎七分調牛膽南星末

二錢熱服立夾陰傷寒先因慾事後感寒邪陽衰陰
三因方夾陰傷寒盛六脉沉伏小腹絞痛四肢

逆冷嘔吐清水不假此藥無以回陽人參乾薑炮各
一兩生附子一枚破作八片水四升半煎一升頓服

脉出身温即愈筋骨風痛人參四兩酒浸三日晒
吳綬傷寒蘊要乾土茯苓一斤山慈姑

一兩為末煉蜜丸梧子大每服小兒風癇瘰癧用人
一百丸食前米湯下經驗方參蛤粉辰

砂等分為末以麩猪心和血丸綠豆大每服五十丸金銀湯下一日二服大有神效衛生寶鑑

虛慢驚

黃者湯見黃者發明下

痘疹險證

保和湯見黃者發明下

驚後瞳

斜

小兒驚後瞳人不正者人參阿膠糯米炒成珠各一錢水一盞煎七分溫服日再服愈乃止效直

指小兒脾風

多因人參冬瓜仁冬半兩南星一兩漿水煮過為末每用一錢水半盞煎三分

溫服

本事方酒毒目盲

一人形實好飲熱酒忽病目盲而脉濇此熱酒所傷胃氣汚濁血死

其中而然以蘇木煎湯調人參末一錢服次日鼻及兩掌皆紫黑此滯血行矣再以四物湯加蘇木桃仁

紅花陳皮調數日而愈

人參末服丹溪纂要

酒毒生疽

一婦嗜酒胸生一疽脉紫而濇用酒

炒人參酒炒大黃等分為末薑湯服一錢得唾汗出而愈效丹溪醫案

狗咬風傷腫痛

置桑柴炭上燒存性以盥覆定
少頃為末摻之立瘥
經驗方蜈蚣咬傷嚼人參塗
醫學

集蜂蠆螫傷入參末傅之
證治要訣脇破腸出急以油抹入煎
人參枸杞汁淋

之內喫羊腎粥十日
愈危氏得效方氣奔忤疾方見
虎杖

蘆氣味苦溫無毒主治吐虛勞痰飲
時珍

發明

吳綬曰人弱者以人參蘆代瓜蒂震亨曰人參
入手太陰補陽中之陰蘆則反能瀉太陰之陽

亦如麻黃苗能發汗根則止汗穀屬金而糠之性熱
麥屬陽而楚之性涼先儒謂物物具一太極學者可
不觸類而長之乎一女子性躁味厚暑月因怒而病
呃每作則舉身跳動昏冒不知人其形氣俱實乃痰
因怒鬱氣不得降非吐不可遂以人參蘆半兩逆流
水一盞半煎一大盞飲之大吐頑痰數盞大汗昏睡

一日而安又一人作勞發瘡服瘡藥變為熱病舌短痰嗽六脉洪數而滑此痰蓄胸中非吐不愈以參蘆湯加竹瀝二服湧出膠痰三塊次與人參黃耆當歸煎服半月乃安

沙參

本經上品

校正

併入別錄有名未用部羊乳

釋名白參

吳普

知母

別錄

羊乳

別錄

羊婆奶

綱目

鈴兒草

別錄

虎

鬚別錄

苦心

別錄

曰此與人參

玄參丹參

參苦參是為五參其

形不盡相類而生療頗同故皆有參名又有紫參乃

牡蒙也時珍曰沙參白色宜於沙地故名其根多白

汁俚人呼為羊婆奶別錄有名未用羊乳即此也此

物無心味淡而別錄一名苦心又與知母同名不知

所謂也鈴兒

草象花形也

草象花形也

集解

別錄曰沙參生河內川谷及宛句般陽續山二月八月采根暴乾又名羊乳一名地黃三月采

立夏後母死恭曰出華山者為善善曰二月生苗如葵葉青色根白實如芥根大如蕪菁三月采弘景曰今出近道叢生葉似枸杞根白實者佳保昇曰其根若葵根其花白色頌曰今淄齊潞隨江淮荆湖州郡皆有之苗長一二尺以來叢生崖壁間葉似枸杞而有叉了七月開紫花根如葵根大如指許赤黃色中正白實者佳二月八月采根而土生者葉有細有大花白瓣上仍有白粘此為小異藏器曰羊乳根如薺芘而圓大小如拳上有角節折之有白汁人取根當薺芘苗作蔓折之有白汁時珍曰沙參處處山原有之二月生苗葉如初生小葵葉而團扁不光八九月抽莖高一二尺莖上之葉則尖長如枸杞葉而小有細齒秋月葉間開小紫花長一二分狀如鈴鐸五出白蕊亦有白花者並結實大如冬青實中有細子霜

後苗枯其根生沙地者長尺餘大一虎口黃土地者則短而小根莖皆有白汁八九月采者白而實春月采者微黃而虛小人亦往往繫蒸壓實以亂人參但體輕鬆味淡而短耳

根氣味苦微寒無毒

別錄曰羊乳溫無毒普曰沙參岐伯賦神農黃帝扁鵲無毒李

當之大寒好古曰甘微苦之才曰惡防己反藜蘆

主治血結驚氣除寒熱補

中益肺氣

本經

療胸痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪

熱安五臟久服利人又云羊乳主頭腫痛益氣長肌

肉別錄去皮肌浮風疝氣下墜治常欲眠養肝氣宣五

臟風氣

甄權

補虛止驚煩益心肺并一切惡瘡疥癬及

身癢排膿消腫毒

大明

清肺火治久欬肺痿

時珍

發明

元素曰肺寒者用人參肺熱者用沙參代之取其味甘也好古曰沙參味甘微苦厥陰本經之

藥又為脾經氣分藥微苦補陰甘則補陽故潔古取沙參代人參蓋人參性溫補五臟之陽沙參性寒補五臟之陰雖云補五臟亦須各用本臟藥相佐使隨所引而相輔之可也時珍曰人參甘苦溫其體重實專補脾胃元氣因而益肺與腎故內傷元氣者宜之沙參甘淡而寒其體輕虛專補肺氣因而益脾與腎故金能受火尅者宜之一補陽而生陰一補陰而制陽不可不辨之也

附方

舊一

肺熱欬嗽

沙參半兩水煎服

卒得疝氣

小腹

及陰中相引痛如絞白汗出欲

死者沙參

搗篩為末酒服方寸七立瘥肘後方 婦人白帶

多因七情內傷或下元虛冷所致沙參
為末每服二錢米飲調下 證治要訣

薺芫

音齊尼並上聲
別錄中品

校正

併入圖
經杏參

釋名杏參

圖

杏葉沙參

救

荒蕞芫

蕞音底
爾雅

甜桔梗

綱

白

麩根

救

苗名隱忍

以名之時珍曰薺芫多汁有濟澆之狀故
荒蕞蕞濃露也其根如沙參

而葉如杏故河南人呼為杏葉沙參蘇頌圖經杏參
即此也俗謂之皓桔梗爾雅云蕞蕞芫也郭璞云即

薺芫也隱忍
說見下文

集解

弘景曰薺芫根莖都似人參而葉小異根味甜
絕能殺毒以其與毒藥共處毒皆自然歇不正

八方家用也又曰魏文帝言薺芫亂人參即此也薺
芫葉甚似桔梗但葉下光明滑澤無毛為異又不如

人參相對耳恭曰人參苗似五加而潤短莖圓有三
四極極頭有五葉陶引薺芫亂人參誤矣且薺芫桔
梗又有葉差互者亦有葉三四對者皆一莖直上葉
既相亂惟以根有心為別爾頌曰今川蜀江浙皆有
之春生苗莖都似人參而小異根似桔梗但無心為
異潤州陝州尤多人家收以為果或作脯啖味甚甘
美兼可寄遠二月八月采根暴乾承曰今人多以蒸
過壓扁亂人參但味淡爾宗奭曰陶以根言故云薺
芫亂人參蘇以苗言故以陶為悞也機曰薺芫苗莖
與桔梗相似其根與人參相亂今言苗莖都似人參
近於悞也當以人參薺芫桔梗三註參看自明矣時
珍曰薺芫苗似桔梗根似沙參故姦商往往以沙參
薺芫通亂人參蘇頌圖經所謂杏參周憲王救荒本
草所謂杏葉沙參皆此薺芫也圖經云杏參生潯州
田野根如小葉根土人五月采苗葉治欬嗽上氣救
荒本草云杏葉沙參一名白麩根苗高一二尺莖色

清白葉似杏葉而小微尖而背白邊有叉牙杪間開
五瓣白盤子花根形如野胡蘿蔔頗肥皮色灰黝中
間白白味甜微寒亦有開碧花者嫩苗燻熟水淘油
鹽拌食根換水煮亦可食人以蜜煎充果又陶弘景
註桔梗言其葉名隱忍可煮食之治蠱毒謹按爾雅
云莠隱忍也郭璞註云似蘇有毛江東人藏以為菹
亦可淪食葛洪肘後方云隱忍草苗似桔梗人皆食
之搗汁飲治蠱毒據此則隱忍非桔梗乃薺菴苗也
薺菴苗甘可食桔梗苗苦不可食尤為可證神農本
經無薺菴止有桔梗一名薺菴至別錄始出薺菴蓋
薺菴桔梗乃一類有甜苦二
種則其苗亦可呼為隱忍也

根氣味甘寒無毒主治解百藥毒別錄殺蠱毒治蛇蠱

咬熱狂溫疾罽毒箭大利肺氣和中明目止痛蒸切

作羹粥食或作齏菹食

皆

食之壓丹石發動

孟

主欬

嗽消渴強中瘡毒丁腫辟沙蟲短狐毒

時珍

發明

時珍曰薺芫寒而利肺甘而解毒乃良品也而世不知用惜哉按葛洪肘後方云一藥而兼解

衆毒者惟薺芫汁濃飲二升或煮嚼之亦可作散服此藥在諸藥中毒皆自解也又張鷟朝野僉載云各醫言虎中藥箭食清泥而解野豬中藥箭逐薺芫而食物猶知解毒何況人乎又孫思邈千金方治強中為病莖長興盛不交精出消渴之後發為癰疽有薺芫丸豬腎薺芫湯方此皆本草所未及者然亦取其解熱解毒之功爾無他義

附方舊四強中消渴

豬腎薺芫湯治強中之病莖長興盛不交精液自出消渴之後

即發癰疽皆由恣意色慾或餌金石所致宜此以制
腎中熱也用豬腎一具薺芫石膏各三兩人參茯苓
磁石知母葛根黃芩栝樓根甘草各二兩黑大豆一
升水一斗半先煮豬腎大豆取汁一斗去滓下藥再
煮三升分三服後人名為石子薺芫湯又薺芫丸
用薺芫大豆伏神磁石栝樓根熟地黃地骨皮玄參
石斛鹿茸各一兩人參沉香各半兩為末以豬肚治
淨煮爛杵和丸梧子大每服七十九空心鹽湯下

並千丁瘡腫毒

生薺芫根搗汁服一合以滓
傳之不過三度

千金翼面上疔

炮薺芫肉桂各一兩為末每用方寸七
漿服之日一服又減癰瘡

聖濟總錄解諸蠱毒

立瘡根搗末飲服方寸七
陳延之小品方

解鈎吻毒
鈎吻葉與芹葉
相似誤食之殺

人惟以薺芫八兩水六升煮取三升
每服五合日五服仲景金匱玉函解五石毒
薺芫生搗

汁多服之立瘥
蘇頌圖經

隱忍葉氣味甘苦寒無毒主治蟲毒腹痛面目青黃

林露骨立煮汁一二升飲
時珍主腹臑風壅欬嗽上氣

蘇頌

桔梗
本經下品

釋名白藥別錄梗草別錄薺芫
本經時珍曰此草之根結實而梗直故名吳普本草

一名利如一名符危一名房圖方書並無是蓋亦庚詞爾桔梗薺芫乃一類有甜苦二種故本經桔梗一名薺芫而今俗呼薺芫為甜桔梗也至別錄始出薺芫條分為二物然其性味功用皆不同當以別錄為

是

隹解

別錄曰桔梗生嵩高山谷及寃句二月采根暴乾
普曰葉如薺芫莖如筆管紫赤色二月生苗弘

景曰近道處處有二三月生苗可煮食之桔梗療蠱
毒甚驗俗方用此乃名薺芫今別有薺芫能解藥

毒可亂人參葉甚相似但薺芫葉下光明滑澤無毛
為異葉生又不如人參相對耳恭曰薺芫桔梗葉有

差互者亦有葉三四對者皆一莖直上葉既相亂惟
以根有心為別耳頌曰今在處有之根如指大黃白

色春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長隋四葉相對而
生嫩時亦可煮食夏開小花紫碧色頗似牽牛花秋

後結子八月采根其根有心若無心者為薺芫關中
所出桔梗根黃皮似蜀葵根莖細青色葉小青色似

也 菊葉

根修治

數曰凡使勿用木梗真似桔梗只是咬之腥澀不堪凡用桔梗須去頭上尖硬一二分已

來并兩畔附枝于槐砧上細挫用生百合搗膏投水中浸一伏時濾出緩火煎令乾用每桔梗四兩用百

合二兩五錢時珍曰今但刮去浮皮米泔水浸一夜切片微炒用

氣味辛微溫有小毒

普曰神農醫和苦無毒黃帝扁鵲辛鹹岐伯雷公甘無毒李當

之大寒權曰苦辛時珍曰當以苦辛平為是之才曰節皮為之使畏白及龍膽草忌豬肉得牡蠣遠志療

恚怒得消石石膏療傷寒白粥解其發味時珍曰伏砒徐之才所云節皮不知何物也

主治胸

脇痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣本經利五臟腸

胃補血氣除寒熱風痺溫中消穀療喉咽痛下蠱毒

別錄 治下痢破血積氣消聚痰涎去肺熱氣促嗽逆除

腹中冷痛主中惡及小兒驚癇甄權下一切氣止霍亂

轉筋心腹脹痛補五勞養氣除邪辟溫破癥瘕肺癰

養血排膿補內漏及喉痺大明利竅除肺部風熱清利

頭目咽嗑胸膈滯氣及痛除鼻塞元素治寒嘔李杲主口

舌生瘡赤目腫痛時珍

發明好古曰桔梗氣微溫味苦辛味厚氣輕陽中之陰升也入手太陰肺經氣分及足少陰經元素

曰桔梗清肺氣利咽喉其色白故為肺部引經與甘草同行為舟楫之劑如大黃苦泄峻下之藥欲引至

胸中至高之分成功須用辛甘之劑升之譬如鐵石入江非舟楫不載所以諸藥有此一味不能下沉也時珍曰朱肱活人書治胸中痞滿不痛用桔梗枳殼取其通肺利膈下氣也張仲景傷寒論治寒實結胸用桔梗貝母巴豆取其溫中消穀破積也又治肺癰唾膿用桔梗甘草取其苦辛清肺甘溫瀉火又能排膿血補內漏也其治少陰證二三日咽痛亦用桔梗甘草取其苦辛散寒甘平除熱合而用之能調寒熱也後人易名甘桔湯通治咽喉口舌諸病宋仁宗加荆芥防風連翹遂名如聖湯極言其驗也按王好古醫壘元戎載之頗詳云失音加訶子聲不出加半夏上氣加陳皮涎嗽加知母貝母欬渴加五味子酒毒加葛根少氣加人參嘔加半夏生薑唾膿血加紫莞肺痿加阿膠胸膈不利加枳殼心胸痞滿加枳實目赤加梔子大黃面腫加茯苓膚痛加黃耆發斑加防風荆芥疫毒加鼠粘子大黃不得眠加梔子震亨曰

乾欬嗽乃痰火之邪鬱在肺中宜苦梗以開之痢疾腹痛乃肺金之氣鬱在大腸亦宜苦梗開之後用痢藥此藥能開提氣血故氣藥中宜用之

附方

新舊十胸滿不痛

桔梗枳殼等分水二鍾煎服

南陽活人書傷寒

腹脹

陰陽不和也桔梗半夏湯主之桔梗半夏陳皮各三錢薑五片水二鍾煎一鍾服南陽活人

書

痰嗽喘急

桔梗一兩半為末用童子小便半升煎四合去滓溫服簡要濟衆方肺

癰欬嗽

胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久吐膿如粳米粥者桔梗湯主之桔梗一兩

甘草二兩水三升煮一升分溫再服朝喉痺毒氣梗暮吐膿血則瘥張仲景金匱玉函方

二兩水三升煎一少陰咽痛少陰證二三日咽痛者升頓服千金方少陰咽痛可與甘草湯不瘥者與

桔梗湯主之桔梗一兩甘草二兩水三升煮一升分服
張仲景傷寒論 口舌生瘡
上方同

齒蠱腫痛

桔梗薏苡仁等分

骨槽風痛

牙根腫痛桔梗為末棗瓤

和丸皂子大綿裹咬之仍
以荊芥湯嗽之

牙疳臭爛

桔梗芍香等分燒研傳之 衛

生易肝風眼黑

目睛痛肝風盛也

桔梗丸主之 梧

子大每服四十九丸溫水下日二服
保命集

鼻出血

桔梗為末水服方寸七日四服一加

生犀角屑吐血下血

上方同

打擊瘀血

在腸內久不消時發動者 梧

為末米飲下一刀
圭 肘後要方

中蠱下血

如雞肝晝夜出血石餘四臟皆損惟心未毀或

鼻破將死者苦桔梗為末以酒服方寸七日三服不能下藥以物拗口灌之心中當煩須臾自定七日止

當食豬肝肺以補之神良一方
加犀角等分初虞古今錄驗
妊娠中惡心腹疼痛
桔梗一兩

對水一鍾生薑三片煎
六分溫服
小兒客忤死不能言
桔梗燒研三錢米湯服之

仍吞麝香豆許
張文仲備急方

蘆頭主治吐上膈風熱痰實生研末白湯調服一錢

探吐
時珍

長松
遺拾

釋名仙茆
時珍曰其葉如松服之長年
功如松脂及仙茆故有二名

集解
藏器曰長松生關內山谷中草似松葉上有脂
山人服之時珍曰長松生古松下根色如薺芫

長三五寸味甘微苦類人參清香可愛按張天覺文集云僧普明居五臺山患大風眉髮俱墮哀苦不堪忽遇異人教服長松示其形狀明采服之旬餘毛髮俱生顏色如故今并代間土人多以長松雜甘草山藥為湯煎甚佳然本草及方書皆不載獨釋慧祥清涼傳始叙其詳如此韓悉醫通云長松產太行西北諸山根似獨活而香

根氣味甘溫無毒主治風血冷氣宿疾溫中去風

藏器

治大風惡疾眉髮墮落百骸腐潰每以一兩入甘草

少許水煎服旬日即愈又解諸蟲毒補益長年

時珍

附方新長松酒

滋補一切風虛乃廬山休休子所傳長松一兩五錢狀似獨活而香乃酒

中聖藥也熟地黃八錢生地黃黃耆蜜炙陳皮各七錢當歸厚朴黃蘗各五錢白芍藥煨人參枳殼各四錢蒼朮米泔制半夏制天門冬麥門冬砂仁黃連各三錢木香蜀椒胡桃仁各二錢小紅棗肉八個老米一撮燈心五寸長一百二十根一料分十劑絹袋盛之凡米五升造酒一尊煮一袋膏久乃飲韓氏醫通

黃精別錄上品

校正併入拾遺救荒草

釋名黃芝

瑞草經

戊巳芝

五符經

菟竹

別錄

鹿竹

別錄

仙人餘

糧弘景救窮草別錄

米舖蒙筌

野生薑

蒙筌

重樓

別錄

雞格別錄龍

銜雅垂珠

頌曰隋時羊公服黃精法云黃精是芝草之精也一名歲蕤一名白及一名仙人餘

糧一名苟格一名馬箭一名垂珠一名菟竹時珍曰黃精為服食要藥故別錄列于草部之首仙家以為

芝草之類以其得坤土之精粹故謂之黃精五符經云黃精獲天地之淳精故名為戊己芝是此義也餘糧救窮以功名也鹿竹菟竹因葉似竹而鹿兔食之也垂珠以子形也陳氏拾遺救荒草即此也今併為一嘉謨曰根如嫩薑俗名野生薑九蒸九曝可以代糧又名米舖

集解

別錄曰黃精生山谷二月采根陰乾弘景曰今處處有之二月始生一枝多葉葉狀似竹而短

根似姜鞋姜鞋根如荻根及菖蒲概節而平直黃精根如鬼臼黃連大節而不平雖燥並柔有脂潤俗方無用此而為仙經所貴根葉花實皆可餌服酒散隨宜具在斷穀方中其葉乃與鈎吻相似惟莖不紫花不黃為異而人多惑之其類乃殊遂致死生之反亦為奇事數曰鈎吻真似黃精只是葉頭尖有毛鈎子二箇若誤服之害人黃精葉似竹也恭曰黃精肥地生者即大如拳薄地生者猶如拇指姜鞋肥根頗同

小者肌理形色大都相似今以鬼白黃連為比殊無彷彿黃精葉似柳及龍肝徐長卿輩而堅其鉤吻蔓生葉如柿葉殊非比類藏器曰黃精葉偏生不對者名偏精功用不如正精正精葉對生鉤吻乃野葛之別名二物殊不相似不知陶公憑何說此保昇曰鉤吻一名野葛陶說葉似黃精者當是蘇說葉似柿者當別是一物頌曰黃精南北皆有以嵩山茅山者為佳三月生苗高一二尺以來葉如竹葉而短兩兩相對莖梗柔脆頗似桃枝本黃末赤四月開青白花狀如小豆花結子白如黍粒亦有無子者根如嫩生薑而黃色二月采根蒸過暴甘用今遇八月采山中八九蒸九暴作果賣黃黑色而甚甘美其苗初生時人多采為菜茹謂之畢菜味極美江南人說黃精苗葉稍類鉤吻但鉤吻葉頭極尖而根細而蘇恭言鉤吻蔓生恐南北所產之異耳時珍曰黃精野生山中亦可劈根長二寸稀種之一年後極稠子亦可種其葉

似竹而不尖或二葉三葉四五葉俱對節而生其根橫行狀如姜蕤俗采其苗煖熟淘去苦味食之名筆管菜陳藏器本草言青黏是姜蕤見姜蕤發明下又黃精鉤吻之說陶弘景雷斅韓保昇皆言二物相似蘇恭陳藏器皆言不相似蘇頌復設兩可之辭今考神農本草吳普本草並言鉤吻是野葛蔓生其莖如箭與蘇恭之說相合張華博物志云昔黃帝問天老曰天地所生有食之令人不死者乎天老曰太陽之草名黃精食之可以長生太陰之草名鉤吻不可食之入口立死人信鉤吻殺人不信黃精之益壽不亦惑乎按此但以黃精鉤吻相對待而言不言其相似也陶氏因此遂謂二物相對與神農所說鉤吻不合恐當以蘇恭所說為是而陶雷所說別一毒物非鉤吻也歷代本草惟陳藏器辨物最精審尤當信之餘見鉤吻條

根修治

製曰凡采得以溪水洗淨蒸之從已至子薄切暴乾用頌曰羊公服黃精法二月三月采

根入地八九寸為上細切一石以水二石五斗煮去苦味漉出囊中壓取汁澄清再煎如膏乃止以炒黑黃豆末相和得所捏作餅子如錢大初服二枚日益之亦可焙乾篩末水服洗曰餌黃精法取麩子去底釜內安置得所入黃精令滿密蓋蒸至氣溜即暴之如此九蒸九暴若生則刺人咽喉若服生者初時只可一寸半漸漸增之十日不食服止三尺五寸三百日後盡見鬼神久必昇天根葉花實皆可食之但以相對者是正不對者名偏精也

氣味甘平無毒

權曰寒時珍曰忌梅實花葉子並同

主治補中益氣除

風濕安五臟久服輕身延年不饑

別錄補五勞七傷助

筋骨耐寒暑益脾胃潤心肺單服九蒸九暴食之駐

顏斷穀

大明補諸虛止寒熱填精髓下三尸蟲

時珍曰黃精受戊己之淳氣故為補黃宮之勝

珍

發明

時珍曰黃精受戊己之淳氣故為補黃宮之勝品土者萬物之母母得其養則水火既濟木金

交合而諸邪自去百病不生矣神仙芝草經云黃精寬中益氣使五臟調良肌肉充盈骨髓堅強其力增倍多年不老顏色鮮明髮白更黑齒落更生又能先下三尸蟲上尸名彭質好實貨百二日下中尸名彭矯好五味六日下下尸名彭居好五色三十日下皆爛出也根為精氣花實為飛英皆可服食又按雷氏炮炙論序云駐色延年精煎神錦註云以黃精自然汁拌研細神錦于柳木甌中蒸七日以木蜜丸服之木蜜枳椇也神錦不知是何物或云朱砂也禹錫曰按抱朴子云黃精服其花勝其實服其實勝其根

但花難得其生花十斛乾之纔可得五六斗爾非
大有力者不能辦也日服三合服之十年乃得其益
其斷穀不及朮朮餌令人肥健可以負重涉險但不
及黃精甘美易食凶年可與老少代糧謂之米脯也
慎微曰徐鉉稽神錄云臨川士家一婢逃入深山中
久之見野草枝葉可愛取根食之久久不饑夜息大
樹下聞草中動以為虎攫上樹避之及曉下地其身
欻然凌空而去若飛鳥焉數歲家人采薪見之捕之
不得臨絕壁下網圍之俄而騰上山頂或云此婢安
有仙骨不過靈藥服食爾遂以酒餌置往來之路果
來食訖遂不能去擒之具述其
故指所食之草即是黃精也

附方舊一服食法

聖惠方用黃精根莖不限多少細
剉陰乾搗末每日水調末服任多

少一年內變老為少久久成地仙
臞仙神隱書以黃精細切一石用水二石五斗煮之自旦至夕候冷以

手按碎布袋榨取汁煎之渣乾乾為末同入釜中煎至可丸丸如雞子大每服一丸日三服絕糧輕身除

百病渴補肝明目黃精二斤蔓菁一升淘同和九蒸則飲水九晒為末空心每米飲下二錢日

二服延年益壽 聖惠方 大風癩瘡營氣不清久風入脉因而成癩鼻壞色敗用黃精根去皮

潔淨溪水洗二斤暴約粟米飯中蒸至米熟時時食之 聖濟總錄補虛精氣黃精枸

分搗作餅日乾為末煉蜜丸梧子大每湯下五十丸 奇效良方

姜鞋音威絳 本經上品

釋名女姜本經 葳鞋吳普 姜移音威 委姜爾雅 姜香綱目 熒爾雅

音行玉竹別錄 地節別錄 時珍曰按黃公紹古今韻會云葳鞋草木葉垂之貌此草根長多鬚

如冠纓下垂之纒而有威儀故以名之凡羽蓋旌旗之纒纒皆象歲鞋是矣張氏瑞應圖云王者禮備則歲鞋生于殿前一名姜香則威儀之義於此可見別錄作姜鞋有文也說文作姜移音相近也爾雅作委姜字相近也其葉光瑩而象竹其根多節故有姜及玉竹地節諸名吳普本草又有烏女蟲蟬之名宋本一名馬薰即烏姜之訛者也

正誤

弘景曰本經有女姜無姜鞋別錄無女姜有姜鞋而功用正同疑女姜即姜鞋惟名異爾恭曰

女姜功用及苗蔓與姜鞋全別今本經朱書是女姜功效故別錄墨書乃姜鞋功效也歲器曰本草女姜委鞋同傳陶云是一物蘇云二物不同於中品別出女姜一條然其主霍亂洩痢腸鳴正與上品女鞋相合則是更非二物矣頌曰觀古方書所用胡洽治時氣洞下有女姜丸治傷寒冷下結腸丸中用女姜治

虛勞下痢小黃耆酒中加女萎詳此數方所用乃似
中品女萎綠其性溫主霍亂洩痢故也又治賊風手
足枯痺四肢拘攣茵嶺酒中用女萎初虞世治身體
瘰癧班駁有女萎膏乃似上品本經朱書女萎綠其
主中風不能動搖及去肝好色故也又治傷寒七八
日不解續命髓中湯及治脚弱鼈甲湯並用女萎及
延年方治風熱項急痛四肢骨肉煩熱有女萎飲又
主虛風熱發即頭痛有女萎乃似上品別錄墨書女
萎綠其主虛熱溫毒腰痛故也三者既白則非一物
明矣且女萎甘平女萎甘溫安得為一物時珍曰本
經女萎乃爾雅委萎二字即別錄女萎也上古鈔寫
訛為女萎爾古方治傷寒風虛用女萎者即女萎也
皆承本草之訛而稱之諸家不察因中品有女萎名
字相同遂致費辯如此今正其誤只依別錄書女萎
為綱以便尋檢其治洩痢
女萎乃蔓草也見本條

集解

別錄曰萎蕤生太行山谷及丘陵立春後采陰乾普曰葉青黃色相值如薑葉二月七月采

弘景曰今處處有之根似黃精小異服食家亦用之頌曰今滁州舒州及漢中均州皆有之莖幹強直似

竹箭筭有節葉狹而長表白裏青亦類黃精而多鬚根大如指長一二尺可啖三月間開青花結圓實時

珍曰處處山中有之其根橫生似黃精差小黃白色性柔多鬚最難燥其葉如竹兩兩相值亦可采根種

之極易繁也嫩葉及根並可煮淘食茹

根修治

斲曰凡使勿用黃精並鉤吻二物相似萎蕤節上有鬚毛莖斑葉尖處有小黃點為不同

采得以竹刀刮去節皮洗淨以蜜水浸一宿蒸了焙乾用

氣味甘平無毒

普曰神農苦桐君雷公扁鵲甘無毒黃帝辛之才曰畏鹵鹹

主治

女萎主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足久服

去面黑黧好顏色潤澤輕身不老

本經

萎主心腹結

氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛皆爛淚出

別錄

時疾

寒熱內補不足去虛勞客熱頭痛不安加而用之良

甄權補中益氣

蕭炳

除煩悶止消渴潤心肺補五勞七傷

虛損腰脚疼痛天行熱狂服食無忌

大明

服諸石人不

調和者煮汁飲之

弘景

主風溫自汗灼熱及勞瘧寒熱

痺胃虛乏男子小便頻數失精一切虛損

時珍

發明

杲曰萎蕤能升能降陽中陰也其用有四主風溼四末兩目淚爛男子濕注腰痛女子面生黑

黠時珍曰萎蕤性平味甘柔潤可食故朱肱南陽活人書治風溫自汗身重語言難出用萎蕤湯以之為

君藥予每用治虛勞寒熱疔瘡及一切不足之證用代參者不寒不燥大有殊功不止于去風熱濕毒而

已此昔人所未聞者也藏器曰陳壽魏志樊阿傳云青黏一名黃芝一名地節此即萎蕤極似偏精本功

外主聰明調血氣令人強壯和漆葉為散服主五臟益精去三蟲輕身不老變白潤肌膚煖腰脚惟有熱

不可服晉嵇紹有胸中寒疾每酒後苦唾服之得愈草似竹取根花葉陰乾用昔華陀入山見仙人所服

以告樊阿服之壽百歲也頌曰陳藏器以青黏即蕤蕤世無識者未敢以為信然時珍曰蘇頌註黃精疑

青黏是黃精與此說不同今考黃精萎蕤性味功用大抵相近而萎蕤之功更勝故青黏一名黃芝與黃

精同名一名地節與萎蕤
同名則二物雖通用亦可

附方

舊一
新六

服食法

二月九月采萎蕤根切碎一石以水二石煮之從旦至夕以手接爛

布囊榨取汁熬稠其渣晒為末同熬至可丸丸如雞頭子大每服一丸白湯下日三服導氣脉強筋骨治

中風濕毒去面皴顏色久服延年

曜仙神隱書
赤眼澹痛

萎蕤赤芍藥當歸黃連等分煎

湯薰洗
生家寶方

衛眼見黑花

赤痛昏暗甘露湯用萎蕤焙四兩每服二錢水一盞入薄

荷二葉生薑一片蜜少許同煎七分
分卧時溫服日一服
聖濟總錄

小便卒淋

萎蕤兩芭蕉

根四兩水二大盞煎一盞半入滑石二錢分三服
太平聖惠方

發熱口乾

小便澹用萎蕤

五兩煎汁飲之
外臺秘要

乳石發熱

萎蕤三兩炙甘草二兩生犀角一兩水四升煮一升

半分三服
聖惠方
癩後虛腫
小兒癩病瘡後血氣上虛熱在皮膚身面俱腫萎蕤葵子龍膽

茯苓前胡等分為末每服一錢水煎服
聖濟總錄

附錄鹿藥

開寶志曰鹿藥甘溫無毒主風血去諸冷益老起陽浸酒服之生姑臧已西苗根並

似黃精鹿好食其根時珍曰胡洽居士言鹿食九種解毒之草此其一也或云即是萎蕤理亦近之姑附

以俟

附錄委蛇

音威貽別錄曰味甘平無毒主消渴少氣令人耐寒生人家園中大枝長鬚多葉而

兩兩相植子如芥子時珍曰此亦似是萎蕤併俟考訪

知母

本經中品

釋名 蚯母

本經音遲說文作茂

連母

本經 螟母

螟音匙又音提或作莫

貨母

本地參

經本

水參

又名水須水浚

蔞

爾雅音覃

莖

音沈 苦心

草

別錄又名兒踵草女雷女理鹿列非逢東根野藜昌支時珍曰宿根之旁初生子根狀如蚯蟲之狀

故謂之蚯母訛為知母 螟母也餘多未詳

集解

別錄曰知母生河內川谷二月八月采根暴乾弘景曰今出彭城形似菖蒲而柔潤葉至難死

掘出隨生須枯燥乃止禹錫曰按范子云提母出三輔黃白者善郭璞釋爾雅云蔞螟母也生山上葉如

韭頌曰今瀕河懷衛彰德諸郡及解州滌州亦有之四月開青花如韭花八月結實

根修治

殷曰凡使先於槐砧上剉細燒乾木臼杵搗勿犯鐵器時珍曰凡用揀肥潤裏白者去毛

切引經上行則用酒浸焙
乾下行則用鹽水潤焙

氣味苦寒無毒

大明曰苦甘權曰平元素曰氣寒味大辛苦氣味俱厚沉而降陰也又云

陰中微陽腎經本藥入足陽明手太陰經氣分時珍曰得黃蘗及酒良能伏鹽及蓬砂

主治消

渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣本經療傷

寒久瘡煩熱脇下邪氣膈中惡及風汗內疽多服令

人洩

別錄

心煩燥悶骨熱勞往來產後蓐勞腎氣勞憎

寒虛煩

甄權

熱勞傳尸疰痛通小腸消痰止嗽潤心肺

安心止驚悸

大明

涼心去熱治陽明火熱瀉膀胱腎經

火熱厥頭痛下痢腰痛喉中腥臭元素瀉肺火滋腎水

治命門相火有餘好

古

安胎止子煩辟射工溪毒

時珍

發明

權曰知母治諸熱勞患人虛而口乾者加用之
呆曰知母入足陽明手太陰其用有四瀉無根

之腎火療有汗之骨蒸止虛勞之熱滋化源之陰仲
景用此八白虎湯治不得眠者煩躁也煩出於肺躁
出於腎君以石膏佐以知母之苦寒以清腎之源緩
以甘草粳米使不速下也又凡病小便閉塞而渴者
熱在上焦氣分肺中伏熱不能生水膀胱絕其化源
宜用氣薄味薄淡滲之藥以瀉肺火清肺金而滋水
之化源若熱在下焦血分而不渴者乃真水不足膀胱
乾潤乃無陰則陽無以化法當用黃蘗知母大苦
寒之藥以補腎與膀胱使陰氣行而陽自化小便自
通方法詳載木部黃蘗下時珍曰腎苦燥宜食辛以

潤之肺苦逆宜食辛以瀉之知母之辛苦寒涼下則潤腎燥而滋陰上則清肺金而瀉火乃二經氣分藥也黃蘗則是腎經血分藥故二藥必相須而行昔人譬之蝦與水母必相依附補陰之說詳黃蘗條

附方

新舊二

久近痰嗽

自胸膈下塞停飲至於臍臑用知母貝母各一兩為末巴豆三

十枚去油研勻每服一字用薑三片二面蘸藥細嚼嚥下便睡次早必瀉一行其嗽立止壯人乃用之一

方不用巴豆

醫學集成

久嗽氣急

知母去毛切五錢隔紙炒杏仁薑水泡去皮尖焙五錢以

水一鍾半煎一鍾食遠溫服次以蘿蔔子杏仁等分為末末糊丸服五十九薑湯下以絕病根 鄧筆峯

雜興 妊娘子煩

因服藥致胎氣不安煩不得卧者知母一兩洗培為末棗肉丸彈子大每

服一丸人參湯下醫者不識此病作虛煩治反損胎氣產科鄭宗文得此方於陳藏器本草拾遺中用之

良驗 揚歸厚 妊娠腹痛 月未足如欲產之狀用知
產乳集驗方 母二兩為末蜜丸梧子大

每粥飲下二十九 溪毒射工 凡中溪毒知母連根葉
陳延之小品方 搗出散服亦可投水搗

絞汁飲一二升夏月出行多取其屑自隨欲入水先
取少許投水上流便無畏兼辟射工亦可煮湯浴之

甚佳 肘紫癰風疾 醋磨知母擦之日三 嵌甲腫痛
後良方 衛生易簡方

知母燒存性研
摻之多能方

肉蓯蓉 本經上品

釋名肉松容 吳普黑司命 吳普時珍曰此物補而不峻
故有從容之號從容和緩之

貌

集解

別錄曰肉蓯蓉生河西山谷及代郡鴈門五月五日采陰乾普曰生河西山陰地叢生二月至

八月采弘景曰代郡鴈門屬并州多馬處便有之言是野馬精落地所生時似肉以作羊肉羹補虛乏極佳亦可生啜河南間至多今第一出隴西形扁黃柔潤多花而味甘次出北國者形短而少花巴東建平間亦有而不嘉也恭曰此乃論草蓯蓉也陶未見肉者今人所用亦草蓯蓉刮去花代肉蓯蓉功力稍劣保昇曰出肅州福祿縣沙中三月四月掘根長尺餘切取中央好者三四寸繩穿陰乾八月始好皮有松子鱗甲其草蓯蓉四月中旬采長五六寸至一尺以采莖圓紫色大明曰生教落樹下并土塹上此即非馬交之處陶說誤爾又有花蓯蓉即暮春抽苗者力較微爾頌曰今陝西州郡多有之然不及西羌界中來者肉厚而力緊舊說是野馬遺瀝所生今西人去大木間及土塹垣中多生乃知自有種類爾或疑

其初生於馬漚後乃滋植如蒿根生於人血之類是也五月採取恐老不堪故多三月采之震亨曰河西混一之後今方識其真形何嘗有所謂鱗甲者蓋從蓉罕得人多以金蓮根用鹽盆制而為之又以草蓆蓉充之用者宜審嘉謨曰今人以嫩松稍鹽潤偽之

修治

斲曰凡使先須清酒浸一宿至明以椶刷去沙土浮甲劈破中心去白膜一重如竹絲草樣有

此能膈人心前氣不散令人上氣也以甑蒸之從午至酉取出又用酥炙得所

氣味甘微溫無毒

別錄曰酸鹹善曰神農黃帝賦雷公酸李當之小溫

主治五

勞七傷補中除莖中寒熱痛養五臟強陰益精氣多

子婦人癥瘕久服輕身

本

經除膀胱邪氣腰痛止痢

別錄

益髓悅顏色延年大補壯陽日御過倍治女人血崩

甄權男子絕陽不興女人絕陰不產潤五臟長肌肉暖

腰膝男子洩精血遺瀝女子帶下陰痛大

明

發明

好古曰命門相火不足者以此補之乃腎經血分藥也凡服菝蓉以治腎必妨心震亨曰峻補

精血驟用反動大便滑也數曰強筋健髓以菝蓉鮮

魚二味為末黃精汁丸服之可十倍此說出乾寧

記頌曰西人多用作食只刮去鱗甲以酒浸洗去黑

汁薄切合山芋羊肉作羹極美好益人勝服補藥宗

奘曰洗去黑汁氣味皆盡矣然嫩

者方可作羹味苦入藥少則不效

附方

舊一補益勞傷精敗面黑用菝蓉四兩水煮令
新四補益勞傷爛薄細切研精羊肉分為四度

下五味以米煮粥
空心配藥性論
腎虛白濁
肉蓯蓉鹿茸山藥白茯苓等分為末米糊丸梧

子大每棗湯下三
十九 聖濟總錄
汗多便閉
老人虛人皆可
用肉蓯蓉酒浸培二兩研沉香

末一兩為末麻子仁汁打糊丸梧子
大每服七八丸白湯下 濟生方
消中易饑
肉蓯蓉山

菜萸五味子為末蜜丸梧子大
每鹽酒下二十九 醫學指南
破傷風病
口禁身強
肉蓯蓉切

片晒乾用一小盞底上穿定燒烟
于瘡上熏之累效 衛生總錄

列當

宋開寶

釋名粟當開寶草蓯蓉開寶花蓯蓉日華

集解 志曰列當生山南巖石上如藕根初生掘取陰
乾用保昇曰原州秦州渭州靈州皆有之暮春

抽苗四月中旬采取長五六寸至一尺以來莖圓白色
色采取壓扁日乾頌曰草菴蓉根與肉菴蓉極相類
刮去花壓扁以代肉者
功力殊劣即列當也

根氣味甘溫無毒主治男子五勞七傷補腰腎令人

有子去風血煮酒浸酒服之

開寶

附方舊陽事不興果當好者二斤即列當擣篩畢以好酒一斗浸之經宿取起隨性日

飲之 答殷 食醫心鏡

鎖陽補遺

集解時珍曰鎖陽出肅州按陶九成輟耕錄云鎖陽生韃靼田野馬或與蛟龍遺精入地久之發

起如笋上豐下儉鱗甲櫛比筋脉連絡絕類男陽即肉蓯蓉之類或謂里之淫婦就而合之一得陰氣勃然怒長土人掘取洗滌去皮薄切曬乾以充藥貨功力百倍於蓯蓉也時珍疑此自有種類如肉蓯蓉列當亦未必盡是遺精所生也

氣味甘溫無毒主治大補陰氣益精血利大便虛人大便燥結者啖之可代蓯蓉煮粥彌佳不燥結者勿

用震亨潤燥養筋治痿弱時珍

本草綱目卷十二上

欽定四庫全書

本草綱目卷十二下

明 李時珍 撰

草之一 山草類上
一十八種

赤箭

本經上品

天麻

宋開寶

校正

天麻係宋本重
出今併為一

釋名赤箭芝

藥性

獨搖芝

抱朴子

定風草

藥性

離母 本經合離

草 抱朴子

神草

吳普

督郵

本經

弘景曰赤箭亦是芝類
其莖如箭籜赤色葉生其端

根如大魁又云如芋有十二子為衛有風不動無風
自搖如此亦非俗所見而徐長卿亦名鬼督郵又有

鬼箭莖有羽其主療並相似而益大乖異並非此赤箭也頌曰按抱朴子云仙方有合離草一名獨搖芝一名離母所以謂之合離離母者此草下根如芋魁有游子十二枚周環之以做十二辰也去大魁數尺皆有細根如白髮雖相須而實不相連但以氣相屬爾如兔絲之草下有茯苓之根無此則絲不得上亦不相屬也然則赤箭之異陶隱居已云非俗所見兔絲之下有伏菟亦不聞有見者殆其種類時有神異者而如此爾時珍曰赤箭以狀而名獨搖定風以性異而名離母合離以根異而名神草鬼督郵以功而名天麻即赤箭之根開寶本草重出一條詳後集解下

集解

別錄曰赤箭生陳倉川谷雍州及太山少室三月四月八月采根暴乾弘景曰陳倉今屬雍州

扶風郡志曰天麻生鄆州利州太山勞山諸處五月采根暴乾葉如芍藥而小當中抽一莖直上如箭籜

莖端結實狀若續隨子至葉枯時子黃熟其根連一
十二枚猶如天門冬之類形如黃瓜亦如蘆菔大小
不定被人多生噉或蒸煑食之今多用鄆州者佳恭
曰赤箭是芝類莖似箭籜赤色端有花葉赤色遠看
如箭有羽四月開花結實似枯苦棟子核作五六稜
中有肉如麪日暴則枯萎其根皮肉汁大類天門冬
惟無心脉爾去根五六寸有十餘子衛之似芋可生
噉之無乾服之法頌曰赤箭今江湖間亦有之然不
中藥用其苗如蘇恭所說但本經云三月四月八月
采根不言用苗而今方家乃三月四月采苗七月八
月九月采根與本經參差不同難以兼著故但從今
法又曰天麻今汴京東西湖南淮南州郡皆有之春
生苗初出若芍藥獨抽一莖直上高四五尺如箭籜
狀青赤色故名赤箭芝莖中空依半以上貼莖微有
尖小葉稍頭生成穗開花結子如豆粒大其子至夏
不落却透虛入莖中潛生土內其根形如黃瓜連生

一二十枚大者至重半斤或五六兩其皮黃白色名曰龍皮肉名天麻二月三月五月八月肉采初得乘潤刮去皮沸湯畧煮過暴乾收之嵩山衡山人或取生者蜜煎作果食甚珍之宗奭曰赤箭天麻苗也與天麻治療不同故後人分為二條承曰今醫家見用天麻即是赤箭根開寶本草又於中品出天麻一條云出鄆州今之赤箭根苗皆自齊鄆而來者為上蘇頌園經所載天麻之狀即赤箭苗之未長大者也赤箭用苗有自表入裏之功天麻用根有自內達外之理根則抽苗徑直而上苗則結子成熟而落返從籜中而下至土而生此粗可識其外內主治之理今翰林沈括最為博識嘗云古方用天麻不用赤箭用赤箭不用天麻則天麻赤箭本為一物明矣機曰赤箭天麻一物也經分為二以根與苗主治不同也產不同地者各有所宜也時珍曰本經止有赤箭後人稱為天麻甄權藥性論云赤箭一名天麻本自明白

宋人馬志重修本草重出天麻遂致分辨如此沈括
筆談云神農本草明言赤箭采根後人謂其莖如箭
疑當用莖蓋不然也譬如鳶尾牛膝皆因莖葉相似
其用則根何足疑哉上品五芝之外補益上葉赤箭
為第一世人惑於天麻之說遂止用之治風良可惜
哉沈公此說雖是但根莖並皆可用天麻子從莖中
落下俗名還筒子其根暴乾肉色堅白如羊角色呼
羊角天麻蒸過黃皺如乾瓜者俗呼醬瓜天麻皆可
用者一種形尖而空薄如玄參狀者不堪用抱朴子
云獨搖芝生高山深谷之處所生左右無草其莖大
如手指赤如丹素葉似小莧根有大魁如斗細者如
雞子十二枚繞之人得大者服之延年按此乃天麻
中一種神異者如人參中之神參也數曰凡使天麻
勿用御風草二物相似只是葉莖不同御風草根莖
斑葉背白有青點使御風草即勿
使天麻若同用令人有腸結之患

正誤

藏器曰天麻生平澤似馬鞭草節節生紫花花中有子如箱子子性寒作飲去熱氣莖葉搗傳

癰腫承曰藏器所說與赤箭不相干乃別一物也時珍曰陳氏所說乃一種天麻草是益母草之類是也

嘉祐本草誤引入天麻下耳今正其誤

修治

斲曰修事天麻十兩剉安于瓶中用蒺藜子一鎰緩火熬焦蓋于天麻上以三重紙封繫從已

至未取出蒺藜炒過蓋繫如前凡七遍用布拭上氣汗刀劈焙乾單搗用若用御風草亦同此法時珍曰此乃治風痺藥故如此修事也若治肝經風虛惟洗淨以濕紙包於糠火中煨熟取出切片酒浸一宿焙用乾

赤箭氣味辛溫無毒

志曰天麻辛平無毒大明曰甘暖權曰赤箭芝一名天麻味甘

平無毒好古曰苦
平陰中之陽也
主治殺鬼精物蠱毒惡氣久服益

氣力長陰肥健本
經輕身增年消癰腫下支滿寒疝下血

別錄天麻主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰

膝強筋力久服益氣輕身長年
實治冷氣瘧痺攤緩

不隨語多恍惚善驚失志
甄權助陽氣補五勞七傷鬼

疰通血脉開竅服食無忌
大明治風虛眩運頭痛元

發明
杲曰肝虛不足者宜天麻芎藭以補之其用有
四療大人風熱頭痛小兒風癇驚悸諸風麻痺

不仁風熱語言不遂時珍曰天麻乃肝經氣分之藥
素問云諸風掉眩皆屬于木故天麻入厥陰之經而

治諸病按羅天益云眼黑頭旋風虛內作非天麻不能治天麻乃定風草故為治風之神藥今有久復天麻藥遍身發出紅丹者是其祛風之驗也宋奩曰天麻須別藥相佐使然後見其功仍須加而用之人或蜜漬為果或蒸煮食當深思則得矣

附方二 天麻丸

消風化痰清利頭目寬胸利膈治心忪煩悶頭運欲倒項急肩背拘攣神

昏多睡肢節煩痛皮膚瘙癢偏正頭痛鼻艱而目虛浮並宜服之天麻半兩芎藭二兩為末煉蜜丸如茨子大每食後嚼一丸腰脚疼痛天麻半夏細辛各二茶酒任下 普濟方 兩絹袋二箇各盛藥令勻蒸熱文互熨痛處汗出則愈數十再熨 衛生易簡方

還筒子主治定風補虛功同天麻

時珍

附方新益氣固精

補血黑髮益壽有奇效還筒子半兩芡實半兩金銀花二兩破故紙

酒浸春三夏一秋二冬五日焙研末二兩各研末蜜糊丸梧子大每服五十九丸空心鹽湯溫酒任下鄭西

泉所傳方
鄧才雜興方

朮

直律切
本經上品

釋名山薊

本經

楊枹

音

枹薊

馬薊

綱目

山薑

別錄山連

別錄

吃力

伽

日華時珍曰按六書本義朮字篆文象其根幹枝葉之形吳晉本草一名山芥一名天薊

因其葉似薊而味似薑芥也西域謂之吃力伽故外臺秘要有吃力伽散揚州之域多種白朮其狀如枹

故有楊枹及枹薊之名今人謂之吳朮是也枹乃鼓槌之名古方二朮通用後人始有蒼朮之分詳見下

集解

別錄曰木生鄭山山谷漢中南鄭二月三月八月九月采根暴乾弘景曰鄭山即南鄭也今處

處有以蔣山白山茅山者為勝十一月十二月采者
好 多脂膏而甘其苗可作飲甚香美木有二種白木
葉大有毛而作極根甜而少膏可作丸散用赤木葉
細無極根小苦而多膏可作煎用東境木大而無氣
烈不任用今市人賣者皆以米粉塗令白非自然矣
用時宜刮去之頌曰木今處處有之以茅山嵩山者
為佳春生苗青色無極莖作蒿幹狀青赤色長三二
尺以來夏開花紫色碧色亦似刺薊花或有黃白色者
入伏後結子至秋而苗枯根似薑而旁有細根皮黑
心黃白色中有膏液紫色其根乾濕並通用陶隱居
言木有二種則爾雅所謂枹薊即白木也今白木生
杭越舒宣州高山崗上葉葉相對上有毛方莖莖端
生花淡紫碧紅數色根作極生二月三月八月九月
采暴乾用以大塊紫花為勝古方所用木者皆白木

也宗奭曰蒼朮長如大小指肥實皮色微褐其氣味辛烈須米泔浸洗去皮用白朮粗促色微褐其氣亦微辛苦而不烈古方及本經止言朮不分蒼白二種亦宜兩審時珍曰蒼朮山薊也處處山中有之苗高二三尺其葉抱莖而生稍間葉似棠梨葉其脚下葉有三五人皆有鋸齒小刺根如老薑之狀蒼黑色肉白有油膏白朮抱薊也吳越有之人多取根栽蒔一年即稠嫩苗可茹葉稍大而毛根如指大狀如鼓槌亦有大如拳者彼人剖開暴乾謂之削朮亦曰片朮陳自良言白而肥者是浙朮瘦而黃者是幕阜山所出其力劣昔人用朮不分赤白自宋以來始言蒼朮苦辛氣烈白朮苦甘氣和各自施用亦頗有理並以秋采者佳春采者虛軟易壞嵇含南方草木狀云藥有乞力伽即朮也瀕海所產一根有至數斤者采餌尤良嘉謨曰浙朮俗名雲頭朮種平壤頗肥大由糞力也易潤油欽朮俗名狗頭朮雖瘦小得土氣充也

甚燥白勝于浙木寧國昌化池州者並同欽木境相隣也

木

白木也

氣味甘溫無毒

別錄曰甘權曰甘辛杲曰味苦而甘性溫味厚氣薄陽中

陰也可升可降好古曰入手太陽少陰足太陰陽明少陰厥陰六經之才曰防風地榆為之使權曰忌桃李菘菜雀肉青魚嘉謨曰咀後人乳汁潤之制其性也脾病以陳壁土炒過竊土氣以助脾也

主治

風寒濕脾死肌痲疸止汗除熱消食作煎餌久服輕

身延年不饑

本經

主大風在身面風眩頭痛目淚出消

痰水逐皮間風水結腫除心下急滿霍亂吐下不止

利腰臍間血益津液暖胃消穀嗜食

別錄

治心腹脹滿

滿腹中冷痛胃虛下利多年氣痢除寒熱止嘔逆甄權

反胃利小便主五勞七傷補腰膝長肌肉治冷氣瘕

癖氣塊婦人冷瘕大除濕氣和中補陽消痰逐

水生津止渴止瀉痢消足脛濕腫除胃中熱肌熱得

枳實消痞滿氣分佐黃芩安胎清熱元理胃益脾補

肝風虛主舌本強食則嘔胃脘痛身體重心下急痛

心下水痞衝脉為病逆氣裏急臍腹痛好古

發明好古曰本草無蒼白朮之名近世多用白朮治皮間風出汗消痰補胃和中利腰臍間血通水

道無汗而皮毛中而心胃下而腰臍在氣主氣在血主
濕益燥和中補氣其用有九溫中一也去脾胃中濕
二也除胃中熱三也強脾胃進飲食四也和胃生津
液五也止肌熱六也四肢困倦嗜卧目不能開不思
飲食七也止渴八也安胎九也凡中焦不受濕不能
下利必須白朮以逐水益脾非白朮不能去濕非枳
實不能消痞故枳朮丸以之為君機曰脾惡濕濕勝
則氣不得施化津何由生故曰膀胱者津液之府氣
化則能出焉用白朮以除其濕則氣得周流而津液
矣生

附方

舊七新
二十四

枳朮丸

消痞強胃久服令人食自不停
也白朮一兩黃芩土炒過去土

枳實麩炒去麩一兩為末荷葉包飯燒熟搗和丸梧
子大每服五十九白湯下氣滯加橘皮一兩有火加

黃連一兩有痰加半夏一兩有寒加乾薑五錢木
香三錢有食加神麩麥藥各五錢 潔古家珍 枳

木湯

則心下堅大如盤邊如旋盃水飲所作寒氣不足
則手足厥逆腹滿脅鳴相逐陽氣不通即水冷

陰氣不通即骨疼陽前通則惡寒陰前通則痺不仁
陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣乃散實則失氣
虛則遺尿名曰氣分宜此主之白朮一兩枳實七個
水五升煮三升分三服胸中軟即散 仲景金匱玉

函白朮膏

入食滋補止久泄痢上好白朮十斤切片
入瓦鍋內水淹過二寸文武火煎至一半

傾汁入器內以渣再煎如此三次乃取前後汁同熬
成膏入器中一夜傾去面上清水收之每服二三匙

蜜湯調下
千金良方

參朮膏

治一切脾胃虛損益元氣白朮一
斤人參四兩切片以流水十五碗

浸一夜桑柴文武火煎取濃汁熬膏入
煉蜜收之每以白湯點服 集簡方 胸膈煩悶 白

末水服方寸心下有水煎白朮三兩澤瀉五兩水三升

七 千金方 心下有水 煎白朮三兩澤瀉五兩水三升 梅師方

五飲酒癖

一留飲水停心下二癖飲水在兩脅下三痰飲水在胃中四溢飲水在五臟間五流

飲水在腸間皆因飲食胃寒或飲茶過多致此倍朮丸用白朮一斤乾薑炮桂心各半斤為末蜜丸梧子

大每溫水服二三四十肢腫滿白朮三兩呶咀每服丸 惠民和劑局方 四肢腫滿 白朮三兩一盞半大棗

三枚煎九分溫服日三四 中風口噤 不知人事 白朮服不拘時候 本事方 中風口噤 四兩酒三升煮

取一升頓服 產後中寒 遍身冷直口噤不識人白朮千金方 產後中寒 二兩澤瀉一兩生薑五錢水

一升煎服 頭忽眩暈 經夕不瘥四體漸羸飲食無味至寶 頭忽眩暈 好食黃土用朮三斤麴三斤搗

篩酒和丸梧子大每飲服二十九日 濕氣作痛 白朮三服忌菘菜桃李青魚 外臺秘要 濕氣作痛 白朮切片

煎汁熬膏白湯

中濕骨痛

木一兩酒三盞煎一盞頓服不飲酒以水煎之 三

因良婦人肌熱血虛者吃力加散用白朮白茯苓白芍藥各一兩甘草半兩為散薑棗煎

服 王燾 小兒蒸熱脾虛羸瘦不能

風瘙癢疹為末

酒服方寸匕日多 野黯 雀卵色苦酒漬末日日自

汗不止 白朮末飲服方寸匕 脾虛盜汗 白朮四兩切

牡蠣炒一兩同石斛炒一兩同麥麩揀末為末 老小

虛汗 白朮五錢小麥一撮水煮乾去麥為 產後嘔逆

別無他疾者白朮一兩二錢生薑一兩五錢 脾虛脹

滿

脾氣不和冷氣容于中壅遏不通是為脹滿寬中丸用白朮二兩橘皮四兩為末酒糊丸梧子大每

食前木香湯送下三十九丸效

指迷方

脾虛洩瀉

白朮五錢白芍藥一兩冬月用肉豆蔻煨

為末米飲丸梧子大每米飲下五十九日二丹溪心法

濕瀉暑瀉

白朮車前子等分炒為末

白湯下二三錢

久瀉滑腸

白朮炒茯苓各一兩糯米炒二兩為末棗肉拌食或丸服

之簡便方

老小滑瀉

白朮半斤黃土炒過山藥四兩炒為末飯丸量人大小米湯服或加

人參三錢

老人常瀉

白朮二兩黃土拌蒸焙乾去土蒼朮五錢泔浸炒茯苓一

兩為末米糊丸梧子大每米湯下七八十九丸

簡便方

小兒久瀉

脾虛米穀不化不進飲食溫白丸用白朮炒二錢半半夏麴二錢半丁香半錢為末薑汁麴糊丸黍米大每米飲隨大小服之全

幼心 瀉血萎黃 腸風痔漏脫肛瀉血面色萎黃積年
不瘥者白朮一斤黃土炒過研末乾

地黃半斤飯上蒸熟搗和乾則入少酒丸梧
子大每服十五丸米飲下日三服 普濟方 孕婦東

胎日每食前溫水下三十九胎瘦則易產也 保命
白朮枳殼麩炒等分為末燒飯丸梧子大一月一

集牙齒日長 漸至難食名髓 張銳雞峯備急良方
取效即愈也 張銳雞峯備急良方

蒼朮釋名赤朮 別錄山精 抱朴仙朮 綱目山薊 時珍曰異術
錄山精 抱朴仙朮 綱目山薊 時珍曰異術

精也服之令人長生辟穀致神仙故有山精仙朮之
號朮有赤白二種主治雖近而性味止發不同本草

不分蒼白亦未可據今將本經并別錄甄權大明四
家所說功用參考分別各自附方庶使用者有所依

憑

修治

大明曰用木以米泔浸一宿入藥宗奭曰蒼木辛烈須米泔浸洗再換泔浸二日去上粗皮用

時珍曰蒼木性燥故以糯米泔浸去其油切片焙乾用亦有用脂麻同炒以制其燥者

氣味苦溫無毒

別錄曰甘權曰甘辛時珍曰白木甘而微苦性溫而和赤木甘而辛烈性

溫而燥陰中陽也可升可降入足太陰陽明手太陰陽明太陽之經 忌同白木

主治風寒

濕痺死肌痲疸作煎餌久服輕身延年不饑

本經主頭

痛消痰水逐皮間風水結腫除心下急滿及霍亂吐

下不止暖胃消穀嗜食

別錄除惡氣弭災疹

弘景主大風

瘧痺心腹脹痛水腫脹滿除寒熱止嘔逆下泄冷痢

甄權治筋骨軟弱痲痺氣塊婦人冷氣癥瘕山嵐瘴氣

溫疾大明目暖水臟

劉完素

除濕發汗健胃安脾治痿

要藥

李杲

散風益氣總解諸鬱

震亨

治濕痰留飲或挾瘀

血成窠囊及脾濕下流濁瀝帶下滑瀉腸風

時珍

發明

宗奭曰蒼朮氣味辛烈白朮微辛苦而不烈古方及本經止言朮未分蒼白只綠陶隱居言朮

有二種自此人多貴白者往往將蒼朮置而不用如古方平胃散之類蒼朮為最要藥功效尤速殊不詳本草原無白朮之名嵇康曰聞道人遺言餌朮黃精令人久壽亦無白朮字用宜兩雷杲曰本草但言朮不分蒼白而蒼朮別有雄壯上行之氣能除濕下安太陰使邪氣不傳入脾也以其經甘浸火炒故能出汗

與白朮止汗特異用者不可以此代彼蓋有止發之味其餘主治則同元素曰蒼朮與白朮主治同但此白朮氣重而體沈若除上濕發汗功最大若補中焦除脾胃濕力少不如白朮腹中窄狹者須用之震亨曰蒼朮治濕上中下皆有可用又能總解諸鬱痰火濕食氣血六鬱皆因傳化失常不得升降病在中焦故藥必兼升降將欲升之心先降之將欲降之心先升之故蒼朮為足陽明經藥氣味辛烈強胃強脾發穀之氣能徑入諸經疎洩陽明之濕通行斂瀉香附乃陰中快氣之藥下氣最速一升一降故鬱散而平揚士瀛曰脾精不禁小便漏濁淋不止腰背酸疼宜用蒼朮以斂脾精精生于穀故也弘景曰白朮少膏可作丸散赤朮多膏可作煎用昔劉涓子接取其精而丸之名守中金丸可以長生頌曰服食多單餌朮或合白茯苓或合石菖蒲並搗末但日水服晚再進久久彌佳斲取生朮去土水浸再三煎如飴糖酒調

飲之更善今茅山所造木煎是此法也陶隱居言取其精丸之今乃是膏煎恐非真也慎微曰梁庾肩吾答陶隱居賚木煎啓云綠葉抽條紫花標色百邪外禦六府內充山精見書華神在錄木榮火謝盡采擷之難啓旦移申窮淋漓之劑又謝木蒸啓云味重金漿芳踰玉液足使坐致延生伏深銘感又葛洪抱朴子內篇云南陽文氏漢末逃難壺山中饑困欲死有人教之食木遂不饑數十年乃還鄉里顏色更少氣力轉勝故木一名山精神農藥經所謂必欲長生常服山精是也時珍曰按吐納經云紫微夫人木序云吾察草木之勝速益于己者並不及木之多驗也以長生久視遠而更靈山林隱逸得服木者五嶽比肩又神仙傳云陳子皇得餌木要方其妻姜氏得疲病服之自愈顏色氣力如二十時也時珍謹按已上諸說皆似蒼木不獨白木今服食家亦呼蒼木為仙木故皆列于蒼木之後又張仲景辟一切惡氣用赤

術同豬蹄甲燒烟陶隱居亦言術能除惡氣弭火沴故今病疫及歲旦人家往往燒蒼朮以辟邪氣類編載越民高氏妻病恍惚譫語亡夫之鬼憑之其家燒蒼朮烟鬼遽求去夷堅志載江西一士人為女妖所染其鬼將別曰君為陰氣所浸必當暴泄但多服平胃散為良中有蒼朮能去邪也許叔微本事方云微患飲辟三十年始因少年夜坐寫文左向伏几是以飲食多墜左邊中夜必飲酒數杯又向左卧壯時不覺三五年後覺酒止從左下有聲脅痛食減嘈雜飲酒半杯即止十數日必嘔酸水數升暑月止右邊有汗左邊絕無遍訪名醫及海上方間或中病止得月餘復作其補如天雄附子礬石輩利如牽牛甘遂大戰備嘗之矣自揣必有癖囊如水之有科臼不盈科不行但清者可行而濁者停滯無路以決之故積至五七日必嘔而去脾土惡濕而水則流濕莫若燥脾以去濕崇土以填科臼乃悉屏諸藥只以蒼朮一斤

去皮切片為末油麻半兩水二錢研濾汁大棗五十枚煑去皮核搗和丸梧子大每日空腹溫服五十九服增至一二百丸忌桃李雀肉服三月而疾除自此常服不嘔不痛胸膈寬利飲啖如故暑月汗亦周身燈下能書細字皆木之力也初服時必覺微燥以山巵子末沸湯點服解之久服亦自不燥矣

附方

舊三十

服木法

烏髭髮駐顏色壯筋骨明耳目除風氣潤肌膚久服令人輕健

蒼木不計多少米泔水浸三日逐日換水取出刮去黑皮切片暴乾慢火炒黃細擣為末每一斤用蒸過白茯苓末半斤煉蜜和丸梧子大空心卧時熱水下十五丸別用木末六兩甘草末一兩拌和作湯點服吞丸尤妙忌桃李雀蛤鄧才筆峰雜興方除及三白諸血經驗方蒼木膏風濕健脾胃變白駐顏補虛損大有功效蒼木新者刮去皮薄切米泔水浸二日一日一換取出以井華水浸過二寸春秋五

日夏三日冬七日澆出以生絹袋盛之放在一半原
水中揉洗津液出紐乾將渣入搗爛袋盛于一半原
水中揉至汁盡為度將汁入大砂鍋中慢火熬成膏
每一斤入白蜜四兩熬二炷香每膏一斤入水澄白
茯苓末半斤攪勻瓶收每服三匙侵早臨卧各一服
以溫酒送下忌醋及酸物桃李雀蛤菘菜青魚等物
力傷食酒色過度勞逸有傷骨熱用鮮白蒼木二十
斤浸刮去粗皮晒切以米泔浸一宿取出同溪水一
石大砂鍋慢火煎半乾去渣再入石南葉三斤刷去
紅衣積實子一斤川當歸半斤甘草四兩切同煎黃
色澆去渣再煎如稀粥乃入白蜜三斤熬成膏每服
三五錢空心 蒼木丸 兼治內外障眼茅山蒼木洗刮
好酒調服 淨一斤分作四分用酒醋懦泔童尿各浸三日一日
一換取出洗搗晒焙以黑脂麻同炒香共為末酒煮

麩糊丸 梧子大每空心白湯下五十丸 李仲南永
類方八制蒼術丸 疎風順氣養腎治腰脚濕氣脾痛

蒼術一斤洗刮淨分作四分用酒醋米泔鹽水各浸
三日曬乾又分作四分用川椒紅茴香補骨脂黑牽

牛各一兩同炒香揀去不同只取末研末醋糊丸 梧
子大每服五十丸空心鹽酒送下五十歲後加沉香

末一 蒼術散 治風濕常服壯筋骨明目 蒼術一斤粟
米泔浸過竹刀刮去皮半斤以無灰酒

浸半斤以童子小便浸春五夏三秋七冬十日取出
淨地上掘一坑炭火煨赤去炭將浸藥酒缸入坑內

却放末在中以瓦器蓋定泥封一宿取出為末每服
一錢空心溫酒或鹽湯下 萬表積善堂方六制蒼

術散治下元虛損偏墜莖痛茅山蒼術淨刮六斤分
作六分一斤倉米泔浸二日炒一斤酒浸二日炒一

斤青鹽半斤炒黃去鹽一斤小茴香四兩炒黃去茴
一斤大茴香四兩炒黃去茴一斤用桑椹子汁浸二

日炒取末為末每服**固真丹** 瑞竹堂方固真丹燥濕
三錢空心溫酒下 養脾助胃固真茅山蒼

末刮淨一斤分作四分一分青鹽一兩炒一分川椒
一兩炒一分川棟子一兩炒一分小茴香破故紙各

一兩炒並揀末研末酒煮麩糊丸梧子大每空心米
飲下五十丸 乾坤生意平補固真丹治元臟久虛

遺精白濁婦人赤白帶下崩漏金州蒼木刮淨一斤
分作四分一分川椒一兩炒一分破故紙一兩炒一

分茴香食鹽各一兩炒一分川棟子一兩炒取淨木
為末入白茯苓末二兩酒洗當歸末二兩酒煮麩糊

丸梧子大每空心**固元丹** 治元臟久虛遺精白濁五
鹽酒下五十丸 淋及小腸膀胱疝氣婦人

赤白帶下血崩便血等疾以小便頻數為效好蒼木
刮淨一斤分作四分一分小茴香食鹽各一兩同炒

一分川椒補骨脂各一兩同炒一分川烏頭川棟子
肉各一兩同炒一分用醇醕老酒各半斤同煮乾焙

連同炒藥通為末用酒煮糊丸梧子大每服五十九男以溫酒女以醋湯空心下此高司法方也王璆

百一少陽丹蒼木米泔浸半日刮皮晒乾為末一斤選方地骨皮溫水洗淨去心晒研一斤熟桑

椹二十斤入甕盆揉爛絹袋壓汁和末加糊傾入盤內日晒夜露來日精月華待乾研末煉蜜和丸赤小

豆大每服二十丸無灰酒下日三服一年變髮返黑三年面如童子劉松石保壽堂方交感丹

補虛損固精氣烏髭髮此鐵夔城申先生方也久服令人有子茅山蒼木刮淨一斤分作四分用酒醋米

泔鹽湯各浸七日晒研川椒紅小茴香各四兩炒陳米糊和丸梧子大每服四十丸空心溫酒下聖

濟總錄交加丸升水降火除百病蒼木刮淨一斤分作四分一分米泔浸炒一分鹽水浸炒一分

分川椒炒一分破故紙炒黃蘗皮刮淨一斤分作四分一分酒炒一分童尿浸炒一分小茴香炒一分生

用揀去各藥只取朮藥為末煉蜜丸梧子大每
服六十丸空心鹽湯下 鄧才筆峯雜興方 坎離

丸滋陰降火開胃進食強筋骨去濕熱白蒼朮刮淨
一斤分作四分一分川椒一兩炒一分破故紙一

兩炒一分五味子一兩炒一分川芎芩一兩炒只取
朮研末川藥皮四斤分作四分一斤酥炙一斤入乳

汁炙一斤童尿炙一斤米泔炙各十二次研末和勻
煉蜜丸梧子大每服三十丸早用酒午用茶晚用白

湯下 積 不老丹 補脾益腎服之七十亦無白髮茅
善堂方 山蒼朮刮淨米泔浸軟切片四斤

一斤酒浸焙一斤醋浸焙一斤鹽四兩炒一斤椒四
兩炒赤何首烏各二斤泔浸竹刀刮切以黑豆紅棗

各五升同蒸至豆爛曝乾地骨皮去骨一斤各取淨
末以桑椹汁和成劑鋪盆內汁高三指日晒夜露取

日月精華持乾以石臼搗末煉蜜和丸梧子大每空
心酒服一百丸此皇甫敬之方也 王海藏醫壘元

戎靈芝丸

治脾胃氣虛添補精髓通利耳目蒼朮一斤米泔水浸春夏五日秋冬七日逐日換

水竹刀刮皮切晒石臼為末素肉蒸和丸梧子大每服三五十九丸棗湯空心服 奇效良方 補脾

滋腎

生精強骨真仙方也蒼朮去皮五斤為末米泔水漂澄取底用脂麻二升半去殼研爛絹袋濾

去渣澄漿拌木暴乾每服三錢米湯或酒空心調服 孫氏集效方 面黃食少 無血面

食少嗜卧蒼朮一斤熟地黃半斤乾薑炮冬一兩春秋七錢夏五錢為末糊丸梧子大每溫水下五十九丸

濟生 小兒癖疾 蒼朮四兩為末羊肝一具竹刀批開撒末末線縛入砂鍋煮熱搗作

丸服 食生米 男子婦人因食生熟物留滯腸胃遂至生虫久則好食生米否則終日不

樂至憔悴萎黃不思飲食以害其生用蒼朮米泔水浸一夜剉焙為末蒸餅丸梧子大每服五十九食前

米飲下日三服益昌伶人劉清嘯一娼名曰花翠年逾笄病此惠民局監趙尹以此治之兩旬而愈蓋生米留滯腸胃受濕則穀不磨而成此疾蒼朮能去濕暖胃消穀也 楊氏家藏經驗方 腹中虛

冷不能飲食食輒不消羸弱生病朮二斤麴一斤炒為末蜜丸梧子大每服三十丸米湯下日三服大

冷加乾薑三兩腹痛加當歸三兩脾濕水瀉注下困弱兩羸弱加甘草二兩 肘後方 脾濕水瀉無力水穀

不化腹痛甚者蒼朮二兩白芍藥一兩黃芩半兩淡桂二錢每服一兩水一盞半煎一盞溫服脈強頭微

痛去芍藥加防風 暑月暴瀉壯脾胃飲食所傷麴二兩 保命集 木丸用神麴炒蒼朮米

泔浸一夜焙等分為末糊丸梧子大 飧瀉久痢 椒木每服三五十九丸米飲下 和劑局方 丸用

蒼朮二兩川椒一兩為末醋糊丸梧子大每服脾濕二十九丸食前溫水下惡痢久者加桂 保命集 脾濕

下血

蒼朮二兩地榆一兩分作二服水二盞煎一盞食前溫服久痢虛滑以此下桃花丸保命集

腸風下血

蒼朮不拘多少以皂角按濃汁浸一宿煮乾焙研為末麩糊丸如梧子大每服五十

丸空心米飲下日濕氣身痛

蒼朮泔浸切水煎取濃汁熬膏白湯點服簡

方便補虛明目

健骨和胃蒼朮泔浸四兩生地黃焙二兩為末酒糊丸梧子大每溫酒下三五

十九日三服普濟方

青盲雀目

聖惠方用蒼朮四兩泔浸一夜切焙研末每服三錢豬肝

三兩批開摻藥在內扎定入粟米一合水一碗砂鍋煮熟熏眼臨卧食肝飲汁不拘大人小兒皆治又

方不計時月久近用蒼朮二兩泔浸焙搗為末每服一錢以好羊子肝一斤竹刀切破摻藥在內麻扎以

粟米泔煮熟待冷食之以愈為度

眼目昏濇

蒼朮半斤泔浸七日去皮切焙木賊各二兩為

末每服一錢茶酒
任下 聖惠方 嬰兒目澹 不開或出血蒼木二錢
入猪膽中扎煮將藥氣

熏眼後更嚼取汁與
服妙 幼幼新書 風牙腫痛 蒼木鹽水浸過燒存
性研末揩牙去風熱

濟方 普濟蟲怪病 腹中如鐵石 臍中水出旋變作虫行
遠身匪痒難忍撥掃不盡用蒼木濃

煎湯浴之仍以蒼木末入麝香
少許水調服 夏子益奇疾方

苗主治作飲甚香去水 景亦止自汗

狗脊 本經中品

釋名 强脊 別錄扶筋 別錄百枝 本經狗青 吳普恭曰此藥苗
似貫衆根長多岐

狀如狗之脊骨而肉作青綠色故以名之時珍曰强
脊扶筋以功名也別錄又名扶蓋乃扶筋之誤本經

狗脊一名百枝別錄草薺一名赤節而吳普本草謂百枝為草薺赤節為狗脊皆似誤也

集解

別錄曰狗脊生常山川谷二月八月采根暴乾普曰狗脊如草薺莖節如竹有刺葉圓赤根黃

白亦如竹根毛有刺岐伯經云莖一節葉端圓青赤皮白有赤脉弘景曰今山野處處有之與菝葜莫相似而小異其莖葉小肥其節疎其莖大直上有刺葉圓有赤脉根凸凹龍嵒如羊角強細者是頌曰今太行山淄温眉州亦有之苗尖細碎青色高一尺以來無花其莖葉似貫衆而細其根黑色長三四寸多岐似狗之脊骨大有兩指許其肉青綠色春秋采根暴乾今方亦有用金毛者陶氏所說乃有刺草薺非狗脊也今江左俗猶用之數曰凡使狗脊勿用透山藤根形狀一般只是入頂苦不可餌也時珍曰狗脊有二種一種根黑色如狗脊骨一種有金黃毛如狗形皆可入藥其莖細而葉花兩兩對生正似大葉蕨比貫

衆葉有齒面背皆光其根大如拇指有硬黑鬚簇之
吳普陶弘景所說根苗皆似菝葜蘇恭蘇頌所說即
真狗脊也按張揖廣雅云菝葜狗脊也張華博物志
云菝葜與菝葜相亂一名狗脊觀此則昔人以菝葜
為狗脊相承之誤久矣然菝葜菝葜菝葜
脊三者形狀雖殊而功用亦不甚相遠

根修治

斲曰凡修事火燎去鬚細剉了酒浸一夜蒸
之從已至申取出晒乾用時珍曰今人惟剉

炒去毛

鬚用

氣味苦平無毒

別錄曰甘微溫普曰神農苦桐君黃
帝岐伯雷公扁鵲甘無毒李當之小

溫權曰苦辛微熱之才曰
葷解為之使惡敗醬莎草

主治腰背強關機緩急周

痺寒濕膝痛頗利老人

本經

療失溺不節男女脚弱腰

痛風邪淋露少氣目闇堅脊利俛仰女子傷中關節

重別錄男子女人毒氣軟脚腎氣虛弱續筋骨補益男

子甄權強肝腎健骨治風虛時珍

附方新男子諸風

四寶丹用金毛狗脊鹽泥固濟煨紅去毛蘇木草薛川烏頭生用等

分為末米醋和丸梧子大每服室女白帶衝任虛寒鹿茸丸用

金毛狗脊燎去毛白欽各一兩鹿茸酒蒸焙一兩為末用艾煎醋汁打糯米糊丸梧子大每服五十九空

心溫酒下濟生方固精強骨金毛狗脊志遠肉白伏神當歸身等分為末煉蜜丸梧子大每

酒服五十九集簡方病後足腫但節食以養胃氣外用狗脊煎湯漬洗吳授蘊要

貫衆

本經
下品

釋名貫節

本經貫渠

本經百頭

本經又名草鷓頭

別錄黑狗

脊目鳳尾草

圖經時珍曰此草莖葉如鳳尾其根一本而衆枝貫之故草名鳳尾根名貫衆

貫節貫渠渠者魁也吳普本草作貫中俗名貫仲管仲者皆謬稱也爾雅云灤音灼貫衆即此也別錄一

名伯萍一名藥藻皆字訛也金星草一名鳳尾草與此同名宜互考之弘景曰近道皆有之葉如大蕨其

根形色毛芒全似老鷓頭故呼為草鷓頭

集解

別錄曰貫衆生玄山谷及宛句少室山二月八月采根陰乾普曰葉青黃色兩兩相對莖有

黑毛叢生冬夏不死四月花白七月實黑聚相連卷旁生三月八月采根五月采葉保昇曰苗似狗脊狀

如雉尾根直多枝皮黑肉赤曲者名草鷓頭所在山谷陰處則有之頌曰今陝西河東州郡及荆襄間多有之而少有花者春生苗赤葉大如蕨莖幹三稜葉綠色似雞翎又名鳳尾草其根紫黑色形如大瓜下有一黑鬚毛又似老鷓郭璞注爾雅云葉圓銳莖毛黑布地冬不死廣雅謂之貫節是矣時珍曰多生山陰近水處數根叢生一根數莖莖大如筋其涎滑其葉兩兩對生如狗脊之葉而無鋸齒青黃色面深背淺其根曲而有尖梢黑鬚叢族亦似狗脊根而大狀如伏鷓

根氣味苦微寒有毒

之才曰藿菌赤為之使伏石鍾乳小豆

主治腹中

邪熱氣諸毒殺三蟲

本經

去寸白破癥瘕除頭風止金

瘡錄為末水服一錢止鼻血有效

蘇頌

治下血崩中帶

下產後血氣脹痛斑疹毒漆毒骨哽解豬病

時珍

發明

時珍曰貫衆大治婦人血氣根汁能制三黃化五金伏鍾乳結砂制汞且能解毒軟堅王海藏

治夏月豆出不快快斑散用之云貫衆有毒而能解腹中邪熱之毒病因內感而發之於外者多效非古

法之分輕也又黃山谷煮豆帖言荒年以黑豆一升

接淨入貫衆一斤剉如骰子大同以水煮文火斟酌

至豆熟取出日乾覆令展盡餘汁簸去貫衆每日空

心啣豆五七粒能食百草木枝葉有味可飽又王璆

百一選方言滁州蔣教授因食鯉魚玉蟬羹為肋肉

所硬凡藥皆不效或令以貫衆濃煎汁一盞分三服

連進至夜一路而出亦可為末水服一錢觀

此可知其軟堅之功不但治血治瘡而已也

附方新鼻衄不止

貫衆根末水服諸般下血

腸風酒痢

血痔鼠痔下血黑狗脊黃者不用須內肉赤色者即
本草貫衆也去皮毛剉焙為末每服二錢空心米飲
下或醋糊丸梧子大每米飲下三四十九或燒存性
出火毒為末入麝香少許米飲服二錢 普濟方

女人血崩

貫衆半兩煎酒服
之立止 集簡方

產後亡血

過多心腹徹
痛者用貫衆

狀如刺蝟者一個全用不到只揉去毛及花萼以好
醋蘸濕慢火炙令香熟候冷為末米飲空心每服二

錢甚效
婦人良方

赤白帶下

年深諸藥不能療者用上方治
之亦驗名獨聖湯 方同上

年深刻嗽

出膿血貫衆蘇方木等分每服三錢水一
盞生薑三片煎服日二服 久效漸成勞

療鳳尾草為末用魚 豆瘡不快 快斑散用貫衆赤芍
鮮蘆食之 聖惠方 藥各一錢升麻甘草

各五分入淡竹葉三片水一盞 頭瘡白禿 貫衆白芷
半煎七分溫服 王海藏方 為末油調

塗之 又方貫衆燒 漆瘡作癢 油調貫衆末塗 雞魚
末油調塗 聖惠方 漆瘡作癢 之 千金方

骨哽 貫衆縮砂甘草等分為粗末綿包少許 解輕粉
含之嚥汁久則隨痰自出 普濟方

毒齒縫出血臭腫貫衆黃連各半兩煎水入 血痢不
冰片少許時時漱之 陸氏積德堂方

止 陳鳳尾草根即貫衆五錢煎酒服 便毒腫痛 貫衆酒
陳解元吉言所傳 集簡方

良多 能鄙事

花主治惡瘡令人洩 錄別

巴戟天 本經上品

釋名不凋草 日三蔓草 時珍曰名義殊不可曉

集解

別錄曰巴戟天生巴郡及下邳山谷二月八月采根陰乾弘景曰今亦用建平宜都者根狀如

牡丹而細外赤內黑用之打去心恭曰其苗俗名三蔓草葉似茗經冬不枯根如連珠宿根青色嫩根白紫用之亦同以連珠多肉厚者為勝大明曰紫色如小念珠有小孔子堅硬難搗宗奭曰巴戟天本有心乾縮時偶自落或抽去故中心或空非自有小孔也今人欲要中間紫色則多偽以大豆汁沃之不可不察頌曰今江淮河東州郡亦有但不及蜀川者佳多生山林內內地生者葉似麥門冬而厚大至秋結實今方家多以紫色為良蜀人云都無紫色者采時或用黑豆同煮欲其色紫殊失氣味尤宜辨之又有一種乃山葎根正似巴戟但色白土人采得以醋水煮之乃以雜巴戟莫能辨也但擊破視之中紫而鮮潔者偽也其中雖紫又有微白糝有粉色而理小暗者真也真巴戟嫩時亦白乾時亦煮治使紫力劣弱耳

根修治

數曰凡使須用枸杞子湯浸一宿待稍軟漉出再酒浸一伏時漉出同菊花熬焦黃去菊

花以布拭乾用時珍曰今法惟以酒浸一宿劉培入藥若急用只以溫水浸軟去心也

氣味辛甘微溫無毒

大明曰苦之才曰覆盆子為之使惡雷丸丹參朝生

主治

大風邪氣陰痿不起強筋骨安五臟補中增志益氣

本經療頭面遊風小腹及陰中相引痛補五勞益精利

男子

別錄

治男子夜夢鬼交精洩強陰下氣治風癩

甄權

治一切風療水脹

日華

治腳氣去風疾補血海

時珍

出仙經

發明

好古曰巴戟天腎經血分藥也權曰病人虛損加而用之宗爽曰有人嗜酒日須五七盃後患

脚氣甚危或教以巴戟半兩糯米同炒米微轉色去米不用大黃一兩剉炒同為末熟蜜丸溫水服五七

十九仍禁酒遂愈

附錄巴棘

別錄曰味苦有毒主惡疥瘡出虫生高
地葉白有刺根連數十枚一名女木

遠志

本經上品

釋名苗名小草

本經細草

本經棘苑

本經蔓繞

本經時珍曰此草服之能

益智強志故有遠志之稱世說戴謝安云處則為遠志出則為小草記事珠謂之醒心杖

集解

別錄曰遠志生太山及宛句川谷四月采根葉陰乾弘景曰宛句屬兗州濟陰郡今此藥猶從

彭城北蘭陵來用之去心取皮一斤止得三兩爾亦入仙方用小草狀似麻黃而青志曰莖葉似大青而

小比之麻黃陶不識也禹錫曰按爾雅云萋統蕪菟郭璞注云今遠志也似麻黃赤華葉銳而黃其上謂之小草頌曰今河陝洛西州郡亦有之根形如蒿根黃色苗似麻黃而青又如畢豆葉亦有似大青而小者三月開白花根長及一尺泗州出者花紅根葉俱大於他處商州出者根又黑色俗傳夷門出者最佳四月采根晒乾古方通用遠志小草今醫但用遠志稀用小草時珍曰遠志有大葉小葉二種陶弘景所說者小葉也馬志所說者大葉也大葉者花紅

根修治

敷曰凡使須去心否則令人煩悶仍用甘草湯浸一宿暴乾或焙乾用

氣味苦溫無毒

之才曰遠志小草得茯苓冬葵子龍骨良畏珍珠藜蘆蜚蠊齊蛤弘景曰

藥無齊蛤恐是百合也權曰是蟻螬也恭曰藥錄下卷有齊蛤陶說非也
主治欬逆傷中

補不足除邪氣利九竅益智慧耳目聰明不忘強志

倍力久服輕身不老

本經

利丈夫定心氣止驚悸益精

去心下膈氣皮膚中熱面目黃

別錄

殺天雄附子烏頭

毒煎汁飲之

之才

治健忘安魂魄令人不迷堅壯陽道

甄權

長肌肉助筋骨婦人血噤失音小兒客忤

日華腎積

奔豚

好古

治一切癰疽

時珍

葉主治益精補陰氣止虛損夢洩

別錄

發明

好古曰遠志腎經少陰腎經非心經藥也

其功專於強志益精治

善志益精與志皆腎經之所藏也腎精不足則志氣衰不能上通于心故迷惑善忘靈樞經云腎藏精精合志腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘其前言腰痛不可以俛仰屈伸毛悴色夭又云人之善忘者上氣不足下氣有餘腸胃實而心肺虛虛則營衛留于下久之不以時上故善忘也陳言三因方遠志酒治癰疽云有奇功蓋亦補腎之力爾葛洪抱朴子云陵陽子仲服遠志二十年有子三十七人能坐在立亡也

附方

新舊三四

心孔惛塞

多忘善誤丁酉日密自至市買遠志着巾角中還為末服之勿

令人知

胸痺心痛

逆氣膈中飲食不下小草丸用小草桂心乾薑細心蜀椒出汗各三

兩附子二分炮六物搗下篩蜜和丸梧子大先食米汁下三九日三服不知稍增以知為度忌猪肉冷水

生葱菜 范
汪東陽方 喉痺作痛 遠志肉為末吹之 涎
出為度 直指方 腦風頭

痛 不可忍 遠志末
宣明方 吹乳腫痛 遠志焙研 酒服二錢一
以滓傅之 袖珍方 一

切癰疽 遠志酒治一切癰疽發背疔毒惡喉浸大有
死血陰毒在中則不痛傅之即痛有憂怒等

氣積怒攻則痛不可忍傅之即不痛或蘊熱在內熱
逼人不可近傅之即清涼或氣虛冷潰而不斂傅

之即斂此本韓大夫宅用以救人方極驗若七情內
鬱不問虛實寒熱治之皆愈用遠志不以多少末泔

浸洗槌去心為末每服三錢溫酒一盞調 小便赤濁
澄少頃飲其清以滓傅患處 三因方

遠志甘草水煮半斤伏神益智仁各二兩為末
酒糊丸梧子大每空心棗湯下五十九 普濟

百脉根 唐本
草

集解

恭曰出肅州巴西葉似苜蓿花黃根如遠志二月八月采根日乾時珍曰按唐書作柘脉根肅

州歲貢之千金外臺大方中亦時用之今不復聞此或者名稱又不同也

根氣味苦微寒無毒主治下氣止渴去熱除虛勞補

不足酒浸或水煮丸散兼用

唐本

淫羊藿

本經中品

釋名仙靈脾

唐本

放杖草

日華

棄杖草

日華

千兩金

日華

乾雞

筋日華黃連祖

日華

三枝九葉草

圖經

剛前

本經

弘景曰服之使人好為陰

陽西川北部有淫羊一日百遍合蓋食此藿所致故名淫羊藿時珍曰豆葉曰藿此葉似之故亦名藿仙

靈脾千兩金放杖剛前皆言其功力也雞筋黃連祖
皆因其根形也柳子厚文作仙靈毗人臍曰毗此物
補下於
理尤通

集解

別錄曰淫羊藿生上郡陽山山谷蒸曰所在皆
有葉形似小豆而圓薄莖細亦堅俗名仙靈脾

是也頌曰江東陝西秦山漢中湖湘間皆有之莖如
粟稈葉青似杏葉上有刺根紫色有鬚四月開白花
亦有紫花者碎小獨頭子五月采葉晒乾湖湘出者
葉如小豆枝莖堅細經冬不凋根似黃連關中呼為
三枝九葉草苗高一二尺許根葉俱堪用蜀本草言
生處不聞水聲者良時珍曰生大山中一根數莖莖
粗如線高一二尺一莖二極一極三葉葉長二三
寸如杏葉及豆藿面光背淡甚薄而細齒有微刺

根葉修治

斲曰凡使時呼仙靈脾以夾刀夾去葉四
畔花枝每一斤用羊脂四兩拌炒待脂盡

為度

氣味辛寒無毒

普曰神農雷公辛李當之小寒權曰甘平可單用保昇曰性溫時珍曰甘

香微辛溫之才曰薯蕷紫芝為之使得酒良

主治陰痿絕傷莖中痛利小

便益氣力強志

本

經堅筋骨消瘰癧赤癰下部有瘡洗

出蟲丈夫久服令人有子

別錄機曰無子字誤當作有子

丈夫絕陽

無子女人絕陰無子老人昏耄中年健忘一切冷風

勞氣筋骨攣急四肢不仁補腰膝強心力

大明

發明

時珍曰淫羊藿味甘氣香性溫不寒能益精氣乃手足陽明三焦命門藥也真陽不足者宜之

附方

新舊三五

仙靈脾酒

益丈夫與陽理腰膝冷用淫羊藿一斤酒一斗浸三日逐時飲

之醫心鏡

偏風不遂

皮膚不仁宜服仙靈脾酒仙靈脾一斤細對生絹袋盛于不津器中

用無灰酒二升浸之重封春夏三日秋冬五日後每日暖飲常令醺然不得大醉酒盡再合無不效驗合

時切忌雞犬婦人見

聖惠方

三焦欬嗽

腹滿不飲食氣不順仙靈脾覆盆子五味子炒各一

兩為末煉蜜丸梧子大每薑茶下二十九

聖濟錄 目昏生翳

仙靈脾生王瓜即小枯樓紅色

者等分為末每服一錢茶下日二服

聖濟總錄 病後青盲

日近者可治仙靈脾一兩淡豆

鼓一百粒水一盞半煎一盞頓服即膠

百一選方 小兒雀目

仙靈脾根晚蠶蛾各半兩炙甘

草射干各二錢半為末用羊子肝一枚切開摻藥二錢紫定以黑豆一合來汩一盞煑熟分二次食以汁

送之
普濟方
痘疹入目
仙靈脾威靈仙等分為末每
服五分米湯下
痘疹便覽
牙齒

虛痛
仙靈脾為粗末煎湯
頻漱大效
竒效方

仙茅
宋開寶

釋名獨茅
開寶
茅瓜子
開寶
婆羅門參
珣曰其葉似茅久
服輕身故名仙茅

梵音呼為河輪勒陀
頌曰其根獨生始因西域婆羅
門僧獻方於唐玄宗故今江南呼為婆羅門參言其

功補如
人參也

集解
珣曰仙茅生西域葉似茅其根粗細有節或如
筆管有節文理黃色多延自武城來蜀中諸州

亦皆有之今大庾嶺蜀川江湖兩浙諸州亦有之葉
青如茅而軟且畧濶面有縱文又似初生梭欄秧高

尺許至冬盡枯春初乃生三月有花如梔子花黃色不結實其根獨莖而直大如小指下有短細肉根相附外皮稍粗褐色內肉黃白色二月八月采根暴乾用衛山出者花碧五月結黑子時珍曰蘇頌所說詳盡得之但四五月中抽莖四五寸開小花深黃色六出不似卮子處處大山中有之人惟取梅嶺者用而會典成都歲貢仙茅二十一斤

根修治

斲曰采得以清水洗刮去皮於槐砧上用銅刀切豆許大以生稀布袋盛於烏豆水中浸

一宿取出用酒拌濕蒸之從巳至亥取出暴乾勿犯鐵器及牛乳斑人鬚鬚大明曰彭祖單服法以竹刀刮切糯米泔浸去赤汁出毒後無妨損

氣味辛溫有毒

珣曰甘微溫有小毒又曰辛平宣而復補無大毒有小熱小毒**主治**

心腹冷氣不能食腰脚風冷攣痺不能行丈夫虛勞

老人失溺無子益陽道久服通神強記助筋骨益肌

膚長精神明目開寶治一切風氣補暖腰脚清安五臟

久服輕身益顏色丈夫五勞七傷明耳目填骨髓李

開胃消食下氣益房事不倦大明

發明頌曰五代唐筠州刺史史王顏著續傳信方因圖書編錄西域婆羅門僧服仙茅方當時盛行云

五勞七傷明目益筋骨宣而復補云十斤乳石不及一斤仙茅表其功力也本西域道人所傳開元元年

婆羅門僧進此藥明皇服之有效當時禁方不傳天寶之亂方書流散上都僧不空三藏始得此方傳與

司徒李勉尚書路嗣供給事齊抗僕射張建封服之
皆得力路公久服金石無效得此藥其益百倍齊給
事守晉雲日少氣力風疹繼作服之遂愈八九月采
得竹刀刮去黑皮切如豆粒米泔浸兩宿陰乾搗篩
熟蜜丸梧子大每旦空心酒飲任便下二十九忌飲
器禁食牛乳及黑牛肉大減藥力機曰五臺山有仙
茅患大風者服之多瘥時珍曰按許真君書云仙茅
久服長生其味甘能養肉辛能養肺苦能養氣鹹能
養骨滑能養膚酸能養筋宜和苦酒服之必效也又
范成大虞衡志云廣西英州多仙茅其羊食之舉體
悉化為筋不復有血肉食之補人名乳羊沈括筆談
云夏文莊公稟賦異於人但睡則身冷如逝者既覺
須令人溫之良久乃能動常服仙茅鍾乳硫黃莫知
紀極觀此則仙茅益亦性熱補三焦命門之藥也惟
陽弱精寒稟賦素怯者宜之若體壯相火熾盛者服
之反能動火按張果醫說云一人中仙茅毒舌脹出

口漸大與肩齊因以小刀斫之隨破隨合斫至百數始有血一點出曰可救矣煮大黃朴硝與服以藥摻之應時消縮此皆火盛性淫之人過服之害也弘治間東海張弼梅嶺仙茅詩有使君昨日纔持去今日人來乞墓銘之句皆不知服食之理惟藉藥縱恣以速其生者於仙茅何尤

附方

新

仙茅丸

壯筋骨益精神明目黑髮鬚仙茅二斤糯米泔浸五日去赤水夏月浸三日

日銅刀刮剉陰乾取一斤蒼朮二斤米泔浸五日刮皮焙乾取一斤枸杞子一斤車前子十二兩白茯苓去皮茴香炒栢子仁去殼各八兩生地黃焙熟地黃焙各四兩為末酒煮糊丸如梧子大每服五十九食前溫酒下日二定喘下氣補心腎神秘散用白仙茅服 聖濟總錄 半兩米泔浸三宿晒炒團 參二錢半阿膠一兩半炒雞肫脰一兩燒為末每服二錢糯米飲空心下日二 三因方

玄參

本經
中品

釋名黑參

綱

目玄臺

吳普

重臺

本經

鹿腸

吳普

正馬

別錄

逐馬

藥性

馥香

開寶

野脂麻

綱

目鬼藏

吳普

時珍

曰玄黑色也

別錄

一名咸多未詳

弘景

曰其莖微似人參

故得參名志

曰合香家用之

故俗呼馥草

集解

別錄

曰玄參生河間川谷及宛句三月四月采

根暴乾普曰生宛句山陽三月生苗其葉有毛

四四月實黑弘景曰今出近道處處有之莖似人參而

長大根甚黑亦微香道家時用亦以合香恭曰玄參

根苗並臭莖亦不似人參未見合香志曰其莖方大

高四五尺紫赤色而有細毛葉如掌大而尖長根生

青白乾即紫黑新者潤膩陶云莖似人參蘇言根苗

並臭似未深識頌曰二月生苗葉似脂麻對生又如槐柳而尖長有鋸齒細莖青紫色七月開花青碧色八月結子黑色又有白花者莖方大紫赤色而有細毛有節若竹者高五六尺其根一根五七枚三月八月采暴乾或云蒸過日乾時珍曰今用玄參正如蘇頌所云其根有腥氣故蘇頌以為臭也宿根多地蠶食之故其中空花有紫白二種

根修治

穀曰凡采得後須用蒲草重重相隔入甑蒸兩伏時晒乾用勿犯銅器餌之噎人喉喪人

目

氣味苦微寒無毒

別錄曰鹹普曰神農桐君黃帝雷公苦無毒岐伯寒元素曰足少陰

腎經君藥也治本經須用之才曰惡黃者乾薑大棗山茱萸反藜蘆主治腹中寒熱積

聚女子產乳餘疾補腎氣令人明目

本經

主暴中風傷

寒身熱支滿狂邪忽忽不知人溫瘧洒洒血痂下寒

血除胸中氣下水止煩渴散頸下核癰腫心腹痛堅

癥疔五臟久服補虛明目強陰益精

別錄

熱風頭痛傷

寒勞復治暴結熱散癰痿瘰癧

甄權

治遊風補勞損心

驚煩躁骨蒸傳尸邪氣止健忘消腫毒

大明

滋陰降火

解斑毒利咽喉通小便血滯

時珍

發明

元素曰元參乃樞機之劑管領諸氣上下清肅而不濁風藥中多用之故活人書治傷寒陽毒

汗下後毒不散及心下懊懷煩不得眠心神顛倒欲
 絕者俱用玄參以此論之治胸中膈蘊之氣無根之
 火當以玄參為聖劑也時珍曰腎水受傷真陰失守
 孤陽無根發為火病法宜壯水以制火故玄參與地
 黃同功其消瘰癧亦是散
 火劉守真言結核是火病

附方

舊二 諸毒鼠瘻 玄參漬酒日日飲 年久瘰癧 玄生
 新七 開竇本草

參搗傅之日二 廣利方 赤脉貫瞳 玄參為末以米泔煮猪肝
 易之 煎食之 濟急仙方

發斑咽痛

玄參升麻湯用玄參升麻甘草各半兩
 水三盞煎一盞半温服 南陽活人書 急

喉痺風

不拘大人小兒玄參鼠粘子半生半炒各
 一兩為末新水服一盞立瘥 聖惠方 鼻

中生瘡

玄參末塗之或以水浸 三焦積熱 玄參黃連
 軟塞之 衛生易簡方

兩為末煉蜜丸梧子大每服三四十
丸白湯下小兒丸粟米大丹溪方小腸疝氣黑參吹咀

炒為丸每服一錢半空心酒服
出汗即效孫大仁集效方燒香治癆經驗方用

甘松六兩為末煉蜜一斤和勻入瓶中封閉地中埋
罌十日取出更用灰末六兩煉蜜六兩同和入瓶更

罌五日取出燒之常令聞香疾自愈頌曰初入瓶中
封固煮一伏時破瓶取搗入蜜別以瓶盛埋地中罌

過用亦可
熏衣

地榆本經
中品

校正併入別錄有
名未用酸赭

釋名玉鼓酸赭弘景曰其葉似榆而長初生布地
故名其花子紫黑色如鼓故名

玉鼓時珍曰按外丹方言地榆一名酸赭其味酸其
色赭故也今蘄州俚人呼地榆為酸赭又記赭為棗

則地榆酸赭為一物甚明其主治之功亦同因併別錄有名未用酸赭為一云

集解

別錄曰地榆生桐柏及宛甸山谷二月八月采根暴乾又曰酸赭生昌陽山采無時頌曰今處

處平原川澤皆有之宿根三月內生苗初生布地獨莖直上高三四尺對分出葉葉似榆葉而稍狹細長似鋸齒狀青色七月開花如榷子紫黑色根外黑裏紅似柳根弘景曰其根亦入釀酒道方燒作灰能爛石故煮石方用之其葉山人乏茗時采作飲亦好又可煉如

根氣味苦微寒無毒

別錄曰甘酸權曰苦平元素曰氣微寒味微苦氣味俱薄其體

沉而降陰中陽也專主下焦血呆曰味苦酸性微寒沉也陰也之才曰得髮良惡麥門冬伏丹砂雄黃硫黃
主治婦人乳產痙痛七傷帶下五漏止痛止汗除

惡肉療金瘡

經本

止膿血諸瘻惡瘡熱瘡補絕傷產後

內塞可作金瘡膏消酒除渴明目

錄別

止冷熱痢疔痢

極效

寶開

止吐血鼻衄腸風月經不止血崩產前後諸

血疾并水瀉

大明

治膽氣不足

李杲

汁釀酒治風痺補腦

搗汁塗虎犬蛇蟲傷

時珍

酸赭味酸主內漏止血不足

錄別

發明

頌曰古者斷下多用之炳曰同樗皮治赤白痢宗奩曰其性沉寒入下焦若熱血痢則可用若

虛寒人及水瀉白痢即未可輕使時珍曰地榆除下焦熱治大小便血證止血取上截切片炒用其稍則

能行血不可不知楊士瀛云諸瘡痛者加地榆瘡者加黃芩

附方舊八新六男女吐血

地榆三兩米醋一升煮十餘沸去滓食前稍溫服一合聖惠

方婦人漏下

赤白黃瘦

不止

方同上

血痢不止

地榆

晒研每服二錢摻在

羊血上炙熱食之

以捻頭煎湯送下

聖濟赤白下痢立

者地榆一斤水三升

煮一升半

去滓再煎如稠久病

腸風

痛痒不止地榆煎一鍾空心服

三合

日再服

崔元亮海上方

久病下血不

止

二十餘年者取地榆鼠尾草各二兩水二升煮一升

頓服若不

斷以水漬屋塵飲一小盃投之

肘後

方結陰下血

腹痛

不止

地榆四兩炙甘草三兩每服五錢水一盞入縮砂四七枚煎一盞半

分二服
宣明方
小兒疳痢
地榆煮汁熬如飴糖
與服便已
肘後方
毒蛇螫人
新

搗汁飲兼以
潰瘡
肘後方
虎犬咬傷
地榆煮汁飲并為末
白湯服日

三忌酒
梅師方
代指腫痛
地榆煮汁漬之半
小兒濕瘡
地榆

汁日洗二次
千金方
小兒面瘡
焮赤腫痛
地榆八兩水一斗
煎五升溫洗之
衛生總微

方
煑白石法
七月七日取地榆根不拘多少陰乾百
日燒為灰復取生者與灰合搗萬下灰

三分生末一分合之若石二三斗以水浸過三寸以
藥入水攪之煑至石爛可食乃已
腥仙神隱書

葉主治作飲代茶甚解熱
蘇

丹參
本經
上品

釋名赤參

別錄山參

日華郁蟬草

經本木羊乳

吳普逐馬

弘景奔

馬草

時珍曰五參五色配五臟故人參入脾曰黃參沙參入肺曰白參玄參入腎曰黑參牡蒙入肝

曰紫參丹參入心曰赤參其苦參則右腎命門之藥也古人捨紫參而稱苦參未達此義爾炳曰丹參治風軟脚可逐奔馬故名

奔馬草曾用實有效

集解

別錄曰丹參生桐柏川谷及太山五月采根暴乾弘景曰此桐柏在義陽是淮水發源之山非

江東臨海之桐柏也今近道處處有之莖方有毛紫花時人呼為逐馬普曰莖葉小房如荏有毛根赤色四月開紫花二月五月采根陰乾頌曰今陝西河東州郡及隨州皆有之二月生苗高一尺許莖方有稜青色葉相對如薄荷而有毛三月至九月開花成穗紅紫色似蘇花根赤色大者如指長尺餘一苗數根

恭曰冬采者良夏采者虛惡時珍曰處處山中有之一枝五葉葉如野蘇而尖青色皺毛小花成穗如蛾形中有細子其根皮丹而肉紫

根氣味苦微寒無毒

普曰神農桐君黃帝雷公苦無毒岐伯賦李當之大寒弘景曰

久服多眼赤故應性熱今云微寒恐謬也權曰平之才曰畏鹽水反藜蘆主治心腹邪氣

腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣

本經養血去心腹痼疾結氣腰脊強脚痺除風邪留熱

久服利人別錄漬酒飲療風痺足軟弘景主中惡及百邪

鬼魅腹痛氣作聲音鳴吼能定精甄權養神定志通利

關脈治冷熱勞骨節疼痛四肢不遂頭痛赤眼熱溫

狂悶破宿血生新血安生胎落死胎止血崩帶下調

婦人經脈不勻血邪心煩惡瘡疥癬癭贅腫毒丹毒

排膿止痛生肌長肉大活血通心包絡治疔痛時

發明時珍曰丹參色赤味苦氣平而降陰中之陽也

入手少陰厥陰之經心與包絡血分藥也按婦人

人明理論云四物湯治婦人病不問產前產後經水

多少皆可通用惟一味丹參散主治與之相同蓋丹

參能破宿血補新血安生胎落死胎止崩中帶

下調經脈其功大類當歸地黃芩藜芍藥故也

附方舊三丹參散

治婦人經脈不調或前或後或多

新四丹參散或少產前胎不安產後惡血不下

兼治冷熱勞腰脊痛骨節煩疼用丹參洗淨切落胎
晒為末每服二錢溫酒調下 婦人明理方

下血

丹參十二兩酒五升煮取三升溫服
一升一日三服亦可水煮 千金方 寒疝腹痛

小腹陰中相引痛白汗出欲死以丹參一
兩為末每服二錢熱酒調下 聖惠方 小兒身熱

汗出拘急因中風起丹參半兩鼠屎炒三驚癇發熱
十枚為末每服三錢漿水下 聖濟總錄

丹參摩膏用丹參雷丸各半兩猪膏二兩同煎七上
七下濾去滓盛之每以摩兒身上日三次 千金方

婦人乳癰

丹參白芷芍藥各二兩咬咀以醋淹一夜
猪脂半斤微火煎成膏去滓傅之 孟詵

必效 熱油火灼 除痛生肌丹參八兩剉以水微調取
羊脂二斤煎三上三下以塗瘡上

方 肘後

紫參

本經中品

釋名牡蒙

本經

童腸

別錄

馬行

別錄

衆戎

別錄

五鳥花

綱目時珍曰紫

參

參王孫並有牡蒙之名古方所用牡蒙多是紫參也按錢起詩集云紫參幽芳也五葩連萼狀如飛禽羽

舉故俗名

五鳥花

集解

別錄

曰紫參生河西及宛甸山谷三月采根火灸使紫色普曰紫參一名牡蒙生河西或高山

圓聚生根黃赤有文皮黑中紫五月花紫赤實黑大如豆弘景曰今方家皆呼為牡蒙用之亦少恭曰紫

參葉似羊蹄紫花青穗其根皮紫黑肉紅白肉淺皮深所在有之長安見用者出蒲州牡蒙乃王孫也葉

似及已而大根長尺餘皮肉亦紫色根苗不相似頌曰今河中晉解齊及淮蜀州郡皆有之苗長一二尺

莖青而細其葉青似槐葉亦有似羊蹄者五月開花
白色似蔥花亦有紅紫而似水菘者根淡紫黑色如
地黃狀肉紅白色肉淺而皮深三月采根火炙紫色
又云六月采晒乾用時珍曰紫參根乾紫黑色肉帶
紅白狀如小紫草范子計然云紫
參出三輔有三色以青赤色為善

根氣味苦寒無毒

別錄曰微寒普曰牡蒙神農黃帝
苦李當之小寒之才曰畏辛夷

主治心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便本經療腸

胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精別錄

治心腹堅脹散瘀血治婦人血閉不通甄權主狂瘡瘰

瘡孰血汁出好古治血痢好古牡蒙治金瘡破血生肌肉

止痛赤白痢補虛益氣除脚腫發陰陽

蘇恭

發明

時珍曰紫參色紫黑氣味俱厚陰也沉也八足厥陰之經肝臟血分藥也故治諸血病及寒熱

瘧痢癰腫積塊之屬厥陰者古方治婦人腸覃病烏啄丸所用牡蒙即此物也唐蘇恭註王孫引陳延之

小品方牡蒙所主之證正是紫參若王孫則止治風濕痺證不治血病故今移附于此

附方

舊一
新二

紫參湯

治痢下紫參半斤水五升煎二升入甘草二兩煎取半升分三服

張仲景金匱玉函

吐血不止

紫參人參阿膠炒等分為末烏梅湯服一錢一方去人參加甘

草以糯米湯服

聖惠方 面上酒刺

五參丸用紫參丹參人參苦參沙參各一兩為末胡桃仁

杵和丸梧子大每服三十九丸茶下

普濟

王孫

木經
中品

校正

併入拾
遺旱藕

釋名

牡蒙

景黃孫

別錄旱藕

普曰楚名王孫齊
名長孫又名海孫

吳名白功草又名蔓延時珍曰紫參一名牡
蒙本部合歡一名黃守皆與此名同物異

集解

別錄曰王孫生海西川谷及汝南城郭垣下普
曰蔓延赤文整延相當弘景曰今方家皆呼為

黃昏云牡蒙市人少識者恭曰按陳延之小品方述
本草牡蒙一名王孫徐之才藥對有牡蒙無王孫此

則一物明矣牡蒙葉似及已而大根長尺餘皮肉皆
紫色藏器曰旱藕生太行山中狀如藕時珍曰王孫

葉生顛頂似紫河車葉按神農及吳普本草紫參一
名牡蒙陶弘景亦曰今方家呼紫參為牡蒙其王孫

並無牡蒙之名而陶氏于王孫下乃云又名牡蒙且
無形狀唐蘇恭始以紫參牡蒙為二物謂紫參葉似

羊蹄王孫葉似及已但古方所用牡蒙皆為紫參後
人所用牡蒙乃王孫非紫參也不可辨唐玄宗時
隱民姜撫上言終南山有旱藕餌之延年狀類葛粉
帝取作湯餅賜大臣右驍騎將軍甘守誠曰旱藕者
牡蒙也方家久不用撫易名以神之爾據此牡蒙乃
王孫也蓋紫參止治血證積聚瘡痢而王孫主五臟
邪氣痺痛療百病之文自可推也蘇恭引小品方牡
蒙所主之證乃紫參非王孫故今移附紫參之下

根氣味苦平無毒

普曰神農雷公苦無毒黃帝
甘藏器曰旱藕甘平無毒

主治

五臟邪氣寒濕痺四肢疼酸膝冷痛本經療百病益氣

別錄 旱藕主長生不饑黑毛髮

藏器

紫草

本經
中品

釋名紫丹

別錄

紫芙蓉

音

苾蒻

廣雅音

貌

爾雅音

邈

地血

吳音

鴉

銜草

時珍曰

此草花紫根紫可以染紫故

名爾雅作苾草

俗撞人呼為鴉銜草

集解

別錄曰

紫草生碣山山谷及楚地三月采根陰

乾弘景曰今出襄陽多從南陽新野來彼人種

之即是今染紫者方藥都不復用博物志云平氏陽山紫草特好魏國者染色殊黑比年東山亦種之色

小淺於北者恭曰所在皆有人家或種之苗似蘭香莖赤節青二月開花紫白色結實白色秋月熟時珍

曰種紫草三月逐壟下子九月子熟時刈草春社前後采根陰乾其根頭有白毛如葶未花時采則根色

鮮明花過時采則根色黧惡采時以石壓扁曝乾收時忌人溺及驢馬糞并烟氣皆令草黃色

根修治

斲曰

凡使每一斤用蠟二兩溶水拌蒸

之待水乾取去頭并兩畔髭細剉用

氣味苦寒無毒

權曰甘平元素曰苦溫時珍曰甘鹹寒入手足厥陰經

主治心

腹邪氣五疳補中益氣利九竅

本經

通水道療腫脹滿

痛以合膏療小兒瘡及面皴

別錄

治惡瘡癩癬

甄權

治斑

疹痘毒活血涼血利大腸

時珍

發明

頌曰紫草古方稀用今醫家多用治傷寒時疾發瘡疹不出者以此作藥使其發出韋宙獨行

方治豌豆瘡煮紫草湯飲後人相承用之其效尤速時珍曰紫草味甘鹹而氣寒入心包絡及肝經血分

其功長於涼血活血利大小腸故痘疹欲出未出血熱毒盛大便閉瀉者宜用之已出而紫黑便閉者亦

可用若已出而紅活及白陷大便秘者切宜忌之故楊士瀛直指方云紫草治痘能導大便秘使發出亦輕

得木香白木佐之尤為有益又曾世榮活幼新書云
紫草性寒小兒脾氣實者猶可用脾氣虛者反能作
瀉古方惟用葶取其初得陽氣以類觸類所
以用發痘瘡令人不達此理一概論之非也

附方

新舊二
新六

消解痘毒

紫草一錢陳皮五分葱白三
寸新汲水煎服直指方

癩

童疹痘

三四日隱隱將出未出色赤便閉者紫草二
兩對以百沸湯一盞泡封勿泄氣待溫時服

半合其瘡雖出亦輕大便利者
勿用煎服亦可經驗後方
痘毒黑疔紫草三錢
雄黃一錢

為末以胭脂汁調銀簪挑
破點之極妙集簡方
癰疽便閉紫草枯樓實等
分新水煎服

直指小兒白禿紫草煎汁塗
之聖惠方
小便卒淋紫草一兩為
末每食前用

井華水服二錢
千金翼
產後淋瀝方同上
惡蟲咬人紫草煎油
塗之聖

患火黃身熱午後却涼身有赤點或黑點者不可治宜烙手足心背心百會下廉內服紫草

湯紫草吳藍一兩木香及黃連
一兩水煎服 三十六黃方

白頭翁

本經下品

釋名野丈人本經胡王使者本經奈何草別錄弘景曰處處有之近根處

有白茸狀似白頭老翁故以為名時珍曰丈人胡使奈何皆狀老翁之意

集解別錄曰白頭翁生嵩山谷及田野四月采茶曰其葉似芍藥而大抽一莖莖頭一花紫色似

木槿花實大者如雞子白毛寸餘皆披下似纛頭正似白頭老翁故名馬陶言近根有白茸似不識也太

常所貯蔓生者乃是女萎其白頭翁根似續斷而扁保昇曰所在有之有細毛不滑澤花蕊黃二月采花

四月采實八月采根皆日乾頌曰處處有之正月生
苗作叢生狀似白薇而柔細稍長葉生莖頭如杏葉
上有細白毛而不滑澤近根有白茸根紫色深如蔓
菁其苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同也陶註
未述莖葉蘇蘇註言葉似芍藥實如雞子白毛寸餘者
皆誤矣宗奭曰白頭翁生河南洛陽界其新安山野
中屢嘗見之正如蘇恭所說至今本處山中及人賣
白頭翁丸言服之壽考不失古人命名之義陶氏所
說失於不審宜其排叱也機曰寇宗奭以蘇恭為是
蘇頌以陶說為是大抵此物用根命名取像當准蘇
頌圖經而恭說
恐別是一物也

根氣味苦温無毒

別錄曰有毒吳綬曰苦辛寒權曰
甘苦有小毒豚實為之使大明曰

得酒良花
子莖葉同

主治温瘧狂揚寒熱癥瘕積聚瘵氣逐血

止腹痛療金瘡

本經

鼻衄

別錄

止毒痢

弘景

赤痢腹痛齒痛

百節骨痛項下瘤瘰

甄權

一切風氣暖腰膝明目消贅

大明

發明

頌曰俗醫合補下藥甚驗亦衝人呆曰氣厚味薄可升可降陰中陽也張仲景治熱痢下重用

白頭翁湯主之蓋腎欲堅急食苦以堅之痢則下焦虛故以純苦之劑堅之男子陰疝偏墜小兒頭禿羶腥鼻衄無此不效毒痢有此獲功吳緩曰熱毒下痢紫血鮮血者宜之

附方

舊二新三

白頭翁湯

治熱痢下重用白頭翁二兩黃連黃蘗秦皮各三兩水七升煮

二升每服一升不愈更服婦人產後痢虛極者加甘草阿膠各二兩仲景金匱王函方下痢咽

腫春夏病此宜用白頭翁黃連各一兩末香陰癩偏

腫二兩水五升煎一升半分三服聖惠方陰癩偏

腫白頭翁根生者不限多少搗傅腫處外痔腫痛白

翁草一名野丈人以根搗塗小兒禿瘡白頭翁根搗

之逐血止痛衛生易簡方小兒禿瘡傅一宿作瘡

半月愈肘後方

花主治瘡疾寒熱白禿頭瘡時珍

白及

本經下品

校正

併入別錄白給

釋名連及草本經甘根本經白給時珍曰其根白色連及

而曰甘根反言也吳普作白根其根有白亦通金光

明經謂之固連羅喝悉多又別錄有名未用白給即

白及也性味功用皆同係重出今併為一

集解

別錄曰白及生北山川谷及宛甸及越山又曰白給生山谷葉如藜蘆根白相連九月采晉曰

莖葉如生薑藜蘆十月花直上紫赤色根白連二月八月九月采弘景曰近道處處有之葉似杜若形根似菱米節間有毛方用亦稀可以作糊保昇曰今出申州葉似初生椶苗葉及藜蘆三四月抽出一臺開紫花七月實熟黃黑色冬凋根似菱有三角白色角頭生芽八月采根用頌曰今江淮河陝漢黔諸州皆有之生石山上春生苗長一尺許葉似楸攔兩指大青色夏開紫花二月七月采根時珍曰韓保昇所說形狀正是但一科止抽一莖開花長寸許紅紫色中心如舌其根如菱米有臍如鳧茈之臍又如扁蝸螺

旋紋性
難乾

根氣味苦平無毒

別錄曰辛微寒白給辛平無毒普曰神農苦黃帝辛李當之大寒雷

公辛無毒大明曰甘辛杲曰苦甘微寒性瀋陽中之陰也之才曰紫石英為之使惡理石畏李核杏仁反

烏頭主治癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣賊風鬼

擊痲緩不收

本經除

白癬疥蟲結熱不消陰下痿面上

肝炮令人肌滑

甄權

止驚邪血邪血痢癩疾風痺赤眼

癥結溫熱瘡疾發背癩癰腸風痔瘻撲損刀箭瘡湯

火瘡生肌止痛

大明

止肺血

李杲

白給主伏蟲白癩腫痛

別錄

發明

恭曰山野人患手足蹇折者嚼以塗之有效為其性粘也頌曰今醫家治金瘡不瘥及癰疽方

多用之震亨曰凡吐血不止宜加白及時珍曰白及性瀉而收得秋金之令故能入肺止血生肌治瘡也

按洪邁夷堅志云台州獄吏憫一大囚囚感之因言吾七次犯死罪遭訊拷肺皆損傷至于嘔血人傳一

方只用白及為末米飲日服其效如神後其囚凌遲創者剖其胸見肺間竅穴數十處皆白及填補色猶

不變也洪貫之聞其說赴任洋州一卒忽苦咯血甚危用此救之一日即止也搞玄云試血法吐在水盥

內浮者肺血也沉者肝血也半浮半沉者心血也各隨所見以羊肺羊肝羊心煑熟蘸白及末日日食之

附方

舊一自鼻衄不止津調白及末塗山根上仍以心新八鼻衄不止水服一錢立止經驗方

氣疼痛

白及石榴皮各二錢為末煉蜜丸黃重舌鵝豆大每服三九艾醋湯下生生編

口白及末乳汁調塗
足心聖惠方
婦人陰脫白及川烏頭等分為末絹裏一錢納陰中

入三寸腹內熱即止
日用一次廣濟方
疔瘡腫毒白及末半錢以水澄之去水攤於厚紙上

貼之
袖珍方打跌骨折酒調白及末二錢服其功不減自然銅古銖錢也永類方刀斧

傷損白及石膏煨等分為末搽手足皸裂白及末水調塞之勿

犯水
濟急方湯火傷灼白及末油調傅之趙真人方

三七綱目

釋名山漆綱目金不換時珍曰彼人言其葉左三右四故名三七蓋恐不然或云本名

山漆謂其能合金瘡如漆粘物也
此說近之金不換貴重之稱也

集解

時珍曰生廣西南丹諸州番峒深山中央根暴乾黃黑色團結者狀畧似白及長者如老乾地

黃有節味微甘而苦頗似人參之味或云試法以末
摻猪血中血化為水者乃真近傳一種草春生苗夏
高三四尺葉似菊艾而勁厚有歧尖莖有赤稜夏秋
開黃花蕊如金絲盤紐可愛而氣不香花乾則吐絮
如苦蕒絮根葉味甘治金瘡折傷出血及上下血病
甚效云是三七而根大如牛蒡根與南中來者不類
恐是劉寄奴之
屬甚易繁衍

根氣味甘微苦溫無毒主治止血散血定痛金刃箭
傷跌撲杖瘡血出不止者嚼爛塗或為末摻之其血
即止亦主吐血衄血下血血痢崩中經水不止產後

惡血不下血運血痛赤目癰腫虎咬蛇傷諸病

時珍

發明

時珍曰此藥近時始出南人軍中用為金瘡要藥云有奇功又云凡杖撲傷損瘀血淋漓者隨

嚼爛罨之即止青腫者即消散若受杖時先服一二錢則血不衝心杖後尤宜服之產後服亦良大抵此

藥氣溫味甘微苦乃陽明厥陰血分之藥故能治一切血病與麒麟竭紫釧相同

附方

新

吐血衄血

山漆一錢自嚼米湯送下或以五分加八核湯瀕湖集簡方

赤痢血痢

三七三錢研末米泔水調服即愈

大腸下血

三七研末同淡白酒

調一二錢服三服可愈

分八四物湯亦可

婦人血崩

上方同產後血

多山漆研末米湯

服一錢

男婦赤眼

十分重者以山漆根磨汁塗四圍甚妙

無名癰腫疼痛不止山漆磨米醋調虎咬蛇傷


塗即散已破者研末乾塗

山漆研末

米飲服三錢仍嚼塗之並同上

葉主治折傷跌撲出血傅之即止青腫經夜即散餘

功同根時珍



本草綱目卷十二下